

227 30

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ



КАТАЛОГ ОРИГИНАЛОВ

НОВОСИБИРСК-1982

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ

КАТАЛОГ ОРИГИНАЛОВ,

ХРАНЯЩИХСЯ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СИБИРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ПРИ ИНСТИТУТЕ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ

ТАБУЛЯТЫ

Составитель Н.И. Беспрозванных

НОВОСИБИРСК—1982

Данный выпуск каталога содержит список голотипов и оригиналов палеозойских табулят, хранящихся в Центральном Сибирском геологическом музее Института геологии и геофизики СО АН СССР.

Каталог представляет интерес для специалистов, занимающихся изучением палеозойских кораллов, и палеонтологов широкого профиля.

Введение

Данный каталог является четвертым выпуском и содержит список голотипов, неотипов и оригиналов палеозойских табулят, хранящихся в палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики СО АН СССР. Каталог составлен по работам сотрудников Института и СНИИГТимСа, изданным с 1960 по 1980 год.

Коллекционный материал происходит из палеозойских отложений Сибирской платформы, Северо-Востока СССР, Кузнецкого бассейна, Салаира, Горного Алтая.

Каталог состоит из списков оригиналов, литературы и указателей родов и видов. Для каждого вида указаны: наименование, номер, автор работы и год ее опубликования, страница, таблица, фигура или рисунок. Учтены описанные и изображенные, а также измеренные экземпляры.

В некоторых работах, особенно изданных СНИИГТимСом, не были указаны музейные номера коллекций и отдельных экземпляров, поэтому для них принято следующее описание: сначала для каждого экземпляра ставится музейный номер, за ним в скобках — номер, под которым этот экземпляр опубликован.

Музейный инвентарный номер дается в виде дроби: числитель обозначает номер коллекции; знаменатель — номер экземпляра в данной коллекции.

В процессе составления каталога выявлялось наличие хранящегося материала.

СПИСОК ОРИГИНАЛОВ

ПОДКЛАСС TABULATA

Adetopora annexus Tchudinova

Оригинал – ИГиГ, № 681/156, табл. LXVII, фиг. 3 (обр. 10-24).

Н.В. Миронова, 1974, с. 163.

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Гурьевский холм.

Нижний девон, салаиркинский горизонт.

Alveolitella crassicaulis Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 337/159, табл. LXIV, фиг. 4а-д.

В.Н. Дубатов, 1969, с. 114-116.

Северо-Восток СССР, хребет Сетте-Дабан, руч. Тихий.

Нижний девон, верхнесеттедабанский горизонт.

Alveolitella figurata Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 400/48, табл. XXII, фиг. 3а-в.

В.Н. Дубатов, 1972, с. 92-93.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, средняя часть безымянного ручья, впадающего справа в руч. Щеточный, в 2,8 км выше устья.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

Alveolitella gigantea Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/90, табл. XXXI, фиг. 1а-г; Табл. XXXII, фиг. 1.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 86-88.

Кузнецкий бассейн, район пос. Баскускан, канава около восточного края Баскусканского карьера.

Средний девон, живетский ярус, сафоновские слои.

Alveolitella humilissimus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/156, табл. LXIV, фиг. 1а-в.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/157, табл. LXIV, фиг. 2.

337/158, табл. LXIV, фиг. 3.

В.Н.Дубатов, 1969, с. II3-II4.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правый берег р. Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Alveolitella polenowi Peetz

Оригиналы - ИГиГ, № 400/49, табл. XXII, фиг. 4а, б.

Северо-Восток СССР, хребет Уш-Уракчан, водораздел ручьев Лебяной и Яр, в 2,1 км к юго-западу от высоты 403,3 м.

Средний девон, эйфельский ярус.

400/50, табл. XXII, фиг. 5.

Кузбасс, северная окраина, правый берег р. Мазаловский Китат, в 2,5 км выше устья р. Алчедат.

Средний девон, живетский ярус, сафоновский горизонт.

В.Н.Дубатов, 1972, с. 93-94.

Alveolitella vinkmanae Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/ II6, табл. XLV, фиг. 3а-г (экз. I85а - 22).

Н.В.Миронова, 1974, с. 87.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, вершина правого склона лога Хомичева.

Нижний девон, ремневский(?) горизонт.

Alveolites altaicus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/109, табл. XLVII, фиг. 1а, б (экз. К-48-14).

Окрестности с. Соловьихи, правый склон лога Хомичева, в его средней части.

Оригинал - ИГиГ, № 68I/110, табл. XLVIII, фиг. 1а, б (экз. А-509-107).

Окрестности с. Сибирячихи, правобережье р. Ануй.

Н. В. Миронова, 1974, с. 83.

Горный Алтай.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Alveolites distinctus Yanet

Оригинал - ИГиГ, № 72/89, табл. XXX, фиг. 5а, б.

В. Н. Дубатов, 1963, с. 85-86.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Черновой Бачат, в совхозе ГМЗ, в 250 м к СВ от бывшей Крековской мельницы.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Alveolites dogdensis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/47, табл. XXII, фиг. 2а-в.

Оригинал - ИГиГ, № 400/46, табл. XXII, фиг. I.

В. Н. Дубатов, 1972, с. 90-91.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правый берег р. Хобочало, в I км ниже устья руч. Щеточного.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

Alveolites eximius Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 337/45А, табл. XVII, фиг. 2; табл. XXIII, фиг. 4.

В. Н. Дубатов, 1969, с. 40.

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, р. Чумыш.

Средний девон, эйфельский ярус, пандинские слои.

Alveolites(?) ganinensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/II, табл. XXXIV, фиг. Ia, б (экз. I-II3/852).

Н.В. Миронова, 1965, с. 134.

Горный Алтай, ключ Ганин, близ бывшего пос. Киреевского.

Верхний силур, чагирская свита.

Alveolites ex gr. insignis Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 337/I5, табл. XXII, фиг. 4.

В.Н. Дубатов, 1969, с. 167.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, верховье р. Халим.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинская свита.

Alveolites lidia Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/III, табл. XLVIII, фиг. 2a, б (экз. А - 5076-35).

Н.В. Миронова, 1974, с. 84.

Горный Алтай, окрестности с. Сибирячихи, правый склон р. Ануй.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Alveolites sibiricus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/IO8, табл. XLIX, фиг. Ia, б (экз. Т. 74-198).

Н.В. Миронова, 1974, с. 82.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьиhi, лог Хомичев, верхняя часть.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Alveolites strigosus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/87, табл. XXX, фиг. 4a-г.

В.Н. Дубатов, 1963, с. 84-85.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Салаирки, разведочная линия I6a, средняя часть канавы 46a.

Средний девон, эйфельский ярус, верхняя часть шандинских слонев.

Alveolites strigosus Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 290/9а, табл.III, фиг.6а-в; табл.IV, фиг.Iа-г.

В.Н.Дубатов, Р.Е.Алексеева, 1967, с.26-27.

Пенжинский хребет, левобережье р.Большой Упупкин, в верховье Безымянного ручья.

Средний девон, эйфельский ярус.

Alveolites aff. *suborbicularis* Lamarck

Оригинал - ИГиГ, № 337/I4а, табл.IV, фиг.3.

В.Н.Дубатов, 1969, с.21.

Польша, Свентокшиские горы, Ковала.

Верхний девон, франский ярус.

Alveolites aff. *suborbicularis* Lamarck

Оригинал - ИГиГ, № 337/42, табл.XVI, фиг.4а,б.

В.Н.Дубатов, 1969, с.40.

Польша, Свентокшиские горы, карьер в районе дер.Иваниска.

Средний девон, живетский ярус.

Alveolites tischnoffi Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/6IA, табл.XXVI, фиг.3.

В.Н.Дубатов, 1969, с.50.

Северо-Восток СССР, среднее течение р.Колымы, правый берег, Верхний Половинный камень.

Средний девон, эйфельский ярус.

Alveolites sp.

Оригинал - ИГиГ, № 68I/II2, табл. XLIX, фиг.2 (экз.К-48а-29).

Н.В.Миронова, 1974, с.160.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьи, лог Хомичев.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Amsassia sp.

Оригинал – ИГиГ, № 260/44, табл. XIV, фиг. 5.

Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков, 1963, с. 93.

Сибирская платформа. Река Чуня, в 2 км выше устья реки В. Чунку.

Верхний ордовик, долборский ярус.

Armalites altaicus Mironova

Голотип – ИГиГ, № 68I/I46, табл. LIV, фиг. 1а, б (экз. Г 8–3).

Н.В. Миронова, 1974, с. 107.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьиhi, левобережье кл. Га – нина.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Armalites khomichevensis Mironova

Голотип – ИГиГ, № 68I/I47, табл. LIV, фиг. 3а, б (экз. Т–445–74).

Н.В. Миронова, 1974, с. 108.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьиhi, правый склон лога Хомичева.

Нижний девон, ремневский(?) горизонт.

Armalites suffruticosus Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 72/58, табл. XXIII, фиг. 2а–г.

В.Н. Дубатов, 1963, с. 62–63.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Черневой Бачат в совхозе ГМЗ, в 250 м к северо-востоку от бывшей Крековской мельницы.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Aulocystella salairica Mironova

Оригинал – ИГиГ, № 689а/I6.

П.С. Дзюбо, Н.В. Миронова, 1960, с. 71.

Салаир, р. Уксунай, в 1,5 км выше пос. Жениховского.

Верхний силур, баскуская свита.

Aulopora radugini Tchernyshev

Оригинал – ИГиГ, № 400/1, табл. I, фиг. I.

В.Н.Дубатов, 1972, с.37

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, в 2,5 км от пос. Баскускан.

Средний девон, живетский ярус, сафоновский горизонт.

Axulites anuiensis Mironova

Голотип – ИГиГ, № 549/18, табл. XVII, фиг. 2а, б (экз. А 85-2).

Н.В.Миронова, 1978, с. II3.

Горный Алтай, окрестности с. Черный Ануй, левобережье р. Черги.
Верхний силур, марагдинская свита.

Baikitolites alveolitoides Sokolov

Оригинал – ИГиГ № 260/56, табл. XIX, фиг. I, 2 (обр. I84-4).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.88.

Сибирская платформа. Бассейн р. Подкаменная Тунгуска, р. Чуня, в 5 км ниже устья р. Амуткан.

Верхний ордовик, долборский ярус.

Baikitolites magnus Sokolov et Tesakov

Голотип – ИГиГ, № 260/55, табл. XVIII, фиг. 5, 6 (обр. I7I-I3).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.89.

Сибирская платформа. Бассейн р. Подкаменная Тунгуска, р. Чуня, в 2 км выше устья реки В.Чунку.

Верхний ордовик, долборский ярус.

Barrandeolites(?) nekhoroshevi Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 544/46, табл. XV, фиг. 4.

Оригинал – ИГиГ, № 544/47, табл. XV, фиг. 5.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с. II6.

Рудный Алтай, район г. Лениногорска, Крюковская сопка, отвалы бывшего Крюковского рудника.

Средний девон, крюковская свита.

Calaporesia anticostiensis Billings

Оригинал - ИГиГ, № 260/37, табл. XII, фиг. 3, 4 (обр. 108).
Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков, 1963, с. 71.
Бассейн р. Виллой, р. Марха.
Верхний ордовик.

Calaporesia canadensis Billings

Оригинал - ИГиГ, № 260/38, табл. XII, фиг. 5, 6 (обр. 190/1).
Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков, 1963, с. 72.
Сибирская платформа. Бассейн р. Подкаменная Тунгуска, р. Чуня.
Верхний ордовик, долборский ярус.

Calapora endyashensis (Tchernyshev)

Оригинал - ИГиГ, № 72/102, табл. XXXVI, фиг. 26-г.
В.Н. Дубатолов, 1963, с. 97-98.
Кузнецкий бассейн, правый берег р. Чумыш, в 1 км к востоку от горы Крест.
Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Calapora idonea Yanzet

Оригинал - ИГиГ, № 72/101, табл. XXXVI, фиг. 1а-г.
В.Н. Дубатолов, 1963, с. 96-97.
Кузнецкий бассейн, левый берег р. Кара-Чумыш в районе пос. Белый Камень.
Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Calapora(?) kerneri Rukhin

Неотип - ИГиГ, № 337/162, табл. LXVI, фиг. 1а-д.
В.Н. Дубатолов, 1969, с. 120-121.
Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, левый берег р. Халим, в 1,45 км выше устья руч. Пологого.
Нижний девон, датнинская свита.

Caliaporа macroporosa Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/17, табл. IX, фиг. 1а, б.

Оригиналы - ИГиГ, № 248/18, табл. VIII, фиг. 2.

248/20, табл. IX, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатов, Н.Я.Спаский, 1964, с. 128.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобочало, среднее течение, Коралловые ворота. Нижний девон, датнинская свита.

Caliaporа macroporosa Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/161, табл. LXV, фиг. 2а-д.

В.Н.Дубатов, 1969, с. 118-120.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Caliaporа omoloniensis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/57, табл. XXVII, фиг. 1а-в.

В.Н.Дубатов, 1972, с. 102-103.

Северо-Восток СССР, хребет Уш-Уракчан, левый берег руч.Ледяного, в 100 м выше нижнего устья.

Средний девон, живетский ярус.

Caliaporа primitiva Yanet

Оригиналы - ИГиГ, № 72/96, табл. XXXIV, фиг. 2в.

72/97, табл. XXXIV, фиг. 1а, б.

Левобережье р.Черневой Бачат в совхозе ГМЗ, в 250 м к северо-востоку от бывшей Крековской мельницы.

72/98, табл. XXXV, фиг. 2а, б.

Левобережье р.Черневой Бачат, западный склон холма, расположенного в 100 м к северу от улицы Фурманова в совхозе ГМЗ.

72/99, табл. XXXV, фиг. 3.

Северная часть железнодорожной выемки около дробильного завода в районе г.Гурьевска.

В.Н.Дубатов, 1963, с.93-94.

Кузнецкий бассейн.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Caliapora taltiensis Yanet

Оригиналы - ИГиГ, № 400/58, табл. XXVI, фиг. 2а-г.

Левый берег р. Талалах, в 20 м ниже устья руч. Ледяного.

400/59, табл. XXVI, фиг. 3.

Водораздел р. Талалах и руч. Глухариного, в 1,9 км к юго-востоку от высоты 662,0 м.

В.Н.Дубатов, 1972, с. 101-102.

Северо-Восток СССР, хребет Уш-Уракчан.

Средний девон, живетский ярус.

Caliapora uralica Yanet

Оригинал - ИГиГ, № 72/100, табл. XXXV, фиг. 4а-д.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 94-96.

Кузнецкий бассейн, левый берег р. Кара-Чумыш, в районе дер. Белый Камень.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Catenipora gubachevi Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 261/12, табл. XXIX, фиг. 1, 2.

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. 135.

Бассейн р. Колымы, р. Тирехтях.

Верхний ордовик.

Chaetetes crassimuralis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/131, табл. XLV, фиг. 1а-г.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 122-123.

Кузнецкий бассейн, канава, расположенная у восточного края Баскусканского карьера.

Средний девон, живетский ярус, сафоновские слои.

Chaetetes magnus Lecompte

Оригиналы - ИГиГ, № 72/129, табл. XLIV, фиг. 1б.

Левобережье р. Черновой Бачат, в 100 м к востоку от шурфа 367 на 29-й разведочной линии.

Эйфельский ярус, мамонтовские слои.

72/130, табл. XLIV, фиг. 2а-г.

Канава, расположенная у восточной стены Баскусканского карьера.

Живетский ярус, сафоновские слои.

В.Н. Дубатов, 1963, с. 121-122.

Кузнецкий бассейн.

Средний девон.

Chaetetipora pessima Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/133, табл. XLV, фиг. 3а-в.

В.Н. Дубатов, 1963, с. 125-126.

Кузнецкий бассейн, правобережье р. Черновой Бачат, северо-восточный угол Акарачкинского карьера.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Seratorpora virgulata Mironova

Голотип - ИГиГ, № 6896/6, табл. Д-25, фиг. 4 (экз. 493).

Оригинал - ИГиГ, № 6896/7, табл. Д-25, фиг. 3 (экз. 106-375).

В.Н. Дубатов, Н.В. Миронова, 1960, с. 367.

Восточный склон Салаира, окрестности с. Керлегеш, III разведочная линия.

Нижний девон, крековские слои.

Gladopora bella Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689а/10, табл. S-14, фиг. 1б (экз. II67-24).

П.С. Дзюбо, Н.В. Миронова, 1960, с. 68.

Салаир, окрестности дер. Бачаты.

Верхний силур, сухая свита.

Cladopora cylindrocellularis Dubatolov

Оригинал – ИГиГ, № 544/20, табл.VII, фиг.4а,б.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.103.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, южный борт Андреевского карьера, на уступе с высотной отметкой 880–900 м.

Средний девон, эйфельский ярус, сокольная свита.

Cladopora effecta (Dubatolov)

Оригиналы – ИГиГ, № 72/85, табл.XXX, фиг.1б,в.

Левобережье р.Черновой Бачат, в совхозе ИМЗ, в 250 м к СВ 10° от бывшей Крековской мельницы.

72/86, табл. XXX, фиг.2.

Левобережье р.Салаирки, железнодорожная выемка около Дробильного завода.

В.Н.Дубатов, 1963, с.80–81.

Кузнецкий бассейн.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Cladopora kokscharskajae Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 400/19, табл.XII, фиг.4б,в.

Оригиналы – ИГиГ, № 400/16, табл.XII, фиг.1б.

400/20А, табл.XII, фиг.6б,в.

В.Н.Дубатов, 1972, с.70–71.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правобережье р.Хобочало, левый берег руч.Щеточного, в 1,7 км выше устья.

Средний девон, живетский ярус, себечанский горизонт.

Cladopora microcellulata Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 72/82, табл.XXIX, фиг.2а.

Оригиналы – ИГиГ, № 72/83, табл.XXIX, фиг.3а,в-е.

В.Н.Дубатов, 1963, с.81–83.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, в 200 м к юго-западу от крайнего дома на улице Фурманова в совхозе ИМЗ.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Cladopora microcellulata Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 544/22, табл.VIII, фиг.I.

544/23, табл.VIII, фиг.2.

В.Н.Дубатолов и др., 1980, с.103.

Рудный Алтай, правый берег р.Ульбы, в 30 м ниже слияния рек
Тижой и Тромотухи.

Средний девон, лосишенская свита.

Cladopora orbiculata Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/78, табл.XXVIII, фиг. 6б-ж.

В.Н.Дубатолов, 1963, с.77-78.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Салаирки в районе г.Гурьев-
ска, в 50 м к югу от Малосалаиркинского карьера.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Cladopora suni Tchi

Оригинал - ИГиГ, № 72/77, табл.XVIII, фиг.5а-г.

В.Н.Дубатолов, 1963, с.83-84.

Кузнецкий бассейн, шурф 283 в районе дер.Баскускан, пос. Дуб-
рово.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Cladopora tenuissima Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/23, табл.XIII, фиг.3а-в.

Оригиналы - ИГиГ, № 400/2I, табл.XIII, фиг.I.

400/22, табл.XIII, фиг.2а,б.

Левобережье р.Хобочало, левый берег руч. Глубокого, в 0,4 км
выше устья.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

400/25, табл.XIII, фиг.5.

400/26, табл.XIII, фиг.6.

Левый берег р.Каньонной, в 2,5 км выше устья.

Средний - верхний девон.

В.Н.Дубатолов, 1972, с.71-72.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта.

Cladopora yavorskyi (Dubatolov)

Оригинал - ИГиГ, № 72/88, табл. XXX, фиг. 3а-г.

В.Н.Дубатовол, 1963, с. 78-79.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, в 250 м к северо-востоку от бывшей Крековской мельницы.

Средний девон, эйфельский ярус, нижняя часть салаиркинских слоев.

Cleistopora sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 248/8, табл. IY, фиг. 2.

248/9, табл. IY, фиг. 3.

В.Н.Дубатовол, Н.А.Спасский, 1964, с. 121.

Горный Алтай, Ануйско-Чуйская зона, р.Куваш.

Средний девон, кувашские слои.

Coenites anastomosus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/135, табл. II, фиг. I (экз. А-61-60).

Н.В.Миронова, 1974, с. 97.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьи, правобережье кл.Ганина, правый берег лога Матвеевского, близ его устья.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Coenites bulvankerae Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/47, табл. XIX, фиг. I.

В.Н.Дубатовол, 1969, с. 41.

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, район г.Гурьевска, левобережье р.Салаирки.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Coenites bulvankerae Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 544/35, табл. XII, фиг. 3а-в.

544/36, табл. XII, фиг. 4.

В.Н.Дубатовол и др., 1980, с. 112.

Рудный Алтай, Зырянский район, в 1 км к северу от пос.Греховка, скв. 1823, гл. 530,8 м.

Средний девон, маслянинская свита.

Coenites elegans Mironova

Голотип – ИГиГ, № 68I/134, табл.XIII, фиг.3а-б (экз.КЛ-2-77).

Оригинал – ИГиГ, № 68I/133, табл.XIII, фиг.2 (экз.КЛ-2-93).

Н.В.Миронова, 1974, с.96.

Горный Алтай, окрестности с.Камышенки, левобережье р.Камы –
шенки.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Coenites(?) ganinensis Mironova

Голотип – ИГиГ, № 68I/136, табл.LII, фиг.1а-в (экз.Т-30-38).

Н.В.Миронова, 1974, с.98.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, правый склон долины
кл. Ганина, в I км выше бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Coenites falsus Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 72/103, табл.XXXVII, фиг.1а-е.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.99-100.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, северная
стена Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Coenites longirameus Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 72/104, табл.XXXVII, фиг.2.

Оригинал – ИГиГ, № 72/105, табл.XXXVII, фиг.3.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.100-101.

Кузнецкий бассейн, правый берег р.Баскусан, холм на север –
ном конце пос. Дробильный.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Coenites longirameus Dubatolov

Оригиналы – ИГиГ, № 359/9, табл.II, фиг.6.

359/10, табл.II, фиг.8.

359/II, табл.II, фиг.9.

359/12, табл.II, фиг.10.

359/13, табл.II, фиг.II.

Д.П.Авров, В.Н.Дубатовлов, 1969, с.23-24.

Южный Алтай, хребет Сарымсакты, левый берег р.Саларки.

Средний девон, эйфельский ярус, сарымсактинская свита.

Coenites multicorallites Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/138, табл.LI, фиг.5а-в (экз.Т 445-95а).

Н.В.Миронова, 1974, с.98.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, правобережье лога Хомичева.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Coenites sibiricus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/137, табл.LXXIX, фиг.2а-г (экз.4I3).

Н.В.Миронова, 1974, с.99.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, левый берег р.Малый Бачат, у бывшей Крековской мельницы.

Нижний девон, верхнекрековские слои.

Coenites simakovi Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/65, табл.XXVIII, фиг.2а,б.

Оригинал - ИГиГ, № 400/64, табл.XXVIII,

В.Н.Дубатовлов, 1972, с.106-107.

Северо-Восток СССР, хребет Уш-Уракчан, левый берег р.Талалах, в 80 км ниже среднего устья руч. Ледяного.

Средний девон, живетский ярус, леденинские слои.

Coenites simplex Tchudinova

Оригиналы - ИГиГ, № 400/60, табл.XXVII, фиг.1а-в.

400/60А, табл.XXVII, фиг.2а,б.

Левобережье р.Талалах, восточный склон выс.770,0 м.

Живетский ярус.

400/6I, табл. XXVII, фиг. 3а-в.

Левый берег руч. Ледяного, в 150 м выше устья.

Эйфельский ярус, хемтычанская толща.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с. 105-106.

Северо-Восток СССР, хребет Уш-Уракчан.

Средний девон.

Coenites tenella Gürich

Оригинал - ИГиГ, № 72/106, табл. XXXVII, фиг. 4б, г-ж.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с. 101-102.

Кузнецкий бассейн, район пос. Баскуская, канава, расположенная у восточного края Баскускаянского карьера.

Средний девон, живетский ярус, сафоновские слои.

Coenites vaigachensis (Smirnova)

Оригинал - ИГиГ, № 549/19, табл. XIX, фиг. 6а, б (экз. А 97).

Н.В.Миронова, 1978, с. 114.

Горный Алтай, окрестности с. Черный Ануй, левобережье р. Черги.

Верхний силур, черноануйская свита.

Coenites sp.

Оригинал - ИГиГ, № 68I/139, табл. LI, фиг. 2а-в. (экз. I85б-3).

Н.В.Миронова, 1974, с. 161.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьи, лог Хомичев.

Нижний девон.

Columnoporella aserosa Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/42, табл. XIV, фиг. 2, 3 (обр. 9-9).

Оригинал - ИГиГ, № 260/43, табл. XIV, фиг. 4 (обр. 9-8).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. 76.

Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р. Н.Чунку, у руч. Кану.

Верхний ордовик, бурский горизонт.

Columnoporellia compacta Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/4I, табл. XIII, фиг. 5; табл. XIV, фиг. I.
(обр. II-I).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. 75.

Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р. Н.Чунку, у руч.
Кану.

Верхний ордовик, бурский горизонт.

Crassialveolites abramovi Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/I60, табл. LXV, фиг. Ia-г.

В.Н.Дубатов, 1969, с. II6-II8.

Северо-Восток СССР, хребет Сетте-Дабан, руч. Тихий.

Нижний девон, верхнесеттедабанский горизонт.

Crassialveolites crassimus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/56, табл. XXV, фиг. 2а-в.

В.Н.Дубатов, 1972, с. 99-100.

Северо-Восток СССР, хребт Уш-Уракчан, правый берег руч.

Глухариного, правого притока р.Талалах, в 1,2 км к юго-запа-
ду от высоты 662,0 м.

Средний девон, живетский ярус.

Crassialveolites crassus (Lecompte)

Оригиналы - ИГиГ, № 544/34, табл. XII, фиг. Ia, б.

544/34А, табл. XII, фиг. 2.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с. II0.

Рудный Алтай, южный склон сопки, расположенной в 1,1 км к се-
веру от Четвертого района Ульбастроля.

Нижний девон, тийинская свита.

Crassialveolites(?) diversus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/II4, табл. LXIV, фиг. Ia, б (экз. IOa-II).

Н.В.Миронова, 1974, с. 86.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, левобережье р.Малый Бачат,
Гурьевский холм.

Нижний девон, салаиркинский горизонт.

Crassialveolites evidens Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/95, табл. XXXIV, фиг. 1а-ж.

В.Н.Дубатов, 1963, с.90-91.

Кузнецкий бассейн, район с.Васино, левый берег р.Большие
Измы, около плотины Вассинской ГЭС.

Верхний девон, франский ярус, вассинские слои.

Crassialveolites incrassatus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/94, табл. XXXIII, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.91-93.

Кузнецкий бассейн, левый берег р.Егос, в 50 м выше моста в с.
Сафоново.

Средний девон, живетский ярус, сафоновские слои.

Crassialveolites incrassatus Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/44, табл. XVII, фиг. 1а-в.

В.Н.Дубатов, 1969, с.40.

Северо-Восток СССР, среднее течение р.Колымы, Верхний Половин-
ный камень.

Средний девон, живетский ярус.

Crassialveolites incrassatus Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/44, табл. XLIV, фиг. 2а-г; табл. XXV,
фиг. 1а, б.

В.Н.Дубатов, 1972, с.98.

Северо-Восток СССР, среднее течение р.Колымы, правый берег
выше пос. Вяткино, Верхний Половинный камень.

Средний девон, живетский ярус.

Crassialveolites krekovensis Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 72/91, табл. XXXII, фиг. 2в-ж.

В.Н.Дубатов, 1963, с.88-89.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, северная стена Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Crassialveolites krekovensis Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 681/II2, табл. XLVII, фиг. 2а-в (экз. Т-10-149).

Н.В.Миронова, 1974, с.85.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьи, правый склон долины кл.Ганина, в 50 м выше бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Crassialveolites lamellatus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/45, табл. XXIV, фиг. 1а-г.

В.Н.Дубатов, 1972, с.96.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правобережье р.Догдо, верховье руч.Водопадного.

Средний девон, живетский ярус, себечанский горизонт.

Crassialveolites macrotrematus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/93, табл. XXXIII, фиг. 2а-в; 3в.

В.Н.Дубатов, 1963, с.89-90.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Кара-Чумыл в районе пос.Белый Камень.

Средний девон, эйфельский ярус, мандишские слои.

Crassialveolites multiperforatus (Salé) sensu Lecompte

Оригинал - ИГиГ, № 337/43, табл. XVI, фиг. 5а-б.

В.Н.Дубатов, 1969, с.40.

Польша, Свентокшиские горы, район г.Кальцы, Песьи горки.

Верхний девон, франский ярус.

Crassialveolites pellicularis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/55, табл. XXIII, фиг. 5а-в.

Оригинал - ИГиГ, № 400/51, табл. XXIII, фиг. 1а-г.

400/53, табл. XXIII, фиг. 3.

Хребет Тас-Хаяхта, правый берег р. Хобочало, в 1 км ниже устья руч. Щеточного.

400/52, табл. XXIII, фиг. 2.

Хребет Тас-Хаяхта, правобережье р. Хобочало, средняя часть безымянного ручья, впадающего в руч. Щеточный, в 2,8 км выше устья.

400/54, табл. XXIII, фиг. 4.

Хребет Тас-Хаяхта, в 0,4 км выше устья руч. Глубокого.

В.Н. Дубатов, 1972, с. 95-96.

Северо-Восток СССР.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

Crenulipora aculeatissimus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/6, табл. IV, фиг. 1а-е.

В.Н. Дубатов, Н.Я. Спасский, 1964, с. II 8.

Дальний Восток, район пос. Октябрьский, рч. Большой Желтулак.

Средний девон, эйфельский ярус, имачинская свита.

Cryptolichenaria miranda Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/57, табл. XIX, фиг. 3-6 (обр. 399).

Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков, 1963, с. 90.

Сибирская платформа, Р. Мойеро.

Нижний ордовик, чуньский ярус.

Cyclochaetetes magnificus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/132, табл. XLV, фиг. 2а-г.

В.Н. Дубатов, 1963, с. 123-124.

Кузнецкий бассейн. Левый берег р. Баскуская, холм напротив дробилки.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Cystihalysites dragunovi Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/69, табл. XXIV, фиг. 1, 2 (обр. 136-29).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.103.

Сибирская платформа. Бассейн р. Н.Тунгуска, р. Летняя.
Нижний силур, лландовери.

Cystihalysites liber Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/68, табл.XXIII, фиг.5,6 (обр.302-15).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.102.

Сибирская платформа. Бассейн р. Омнутах, правый приток, в
1,5 км от истока.

Нижний силур, венлок.

Dendropora macropora marcida Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 359/7, табл.II, фиг.4а,б.

Оригинал - ИГиГ, № 359/8, табл.II, фиг.5.

Д.П.Авров, В.Н.Дубатов, 1969, с.22-23.

Рудный Алтай, хребет Сарымсакты, правый берег р.Бухтармы,
3 км выше устья р.Сарымсакты.

Нижний девон, сарымсактинская свита.

Dictyofavosites diversus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/6I, табл.LXXV, фиг.1а,б (экз.75I-5).

Н.В.Миронова, 1974, с.58.

Салаир, Верхнебердский бассейн, в районе дер. Калачики.

Нижний девон, мочегинская свита.

Dictyofavosites graviorus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/50, табл.LXXIV, фиг.2а,б (экз.606-3).

Н.В.Миронова, 1974, с.58.

Центральный Салаир, Верхнебердский бассейн, окрестности пос.
Октябрьского.

Нижний девон, мочегинская свита.

Dictyofavosites microporosus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689б/3, табл.Д-20, фиг.3а,б (экз.233-3).

В.Н.Дубатовлов, Н.В.Миронова, 1960, с.356.

Салаир, Верхнебердский бассейн, район пос.Октябрьского.
Нижний девон, мочегинская свита.

Dictyofavosites microporosus Mironova

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/58, табл.VIII, фиг.2а,б (экз.Г-33-123).

Окрестности с.Камышенки. Ремневский горизонт.

68I/59, табл.XXVIII, фиг.1а,б (экз.Т-74-II8).

68I/60, табл.XXIX, фиг.2а,б (экз.Т-10-181).

Окрестности с.Соловьи, лог Хомичев. Киреевский горизонт.
Н.В.Миронова, 1974, с.60.

Горный Алтай.

Нижний девон.

Dictyofavosites nagorskyi Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/57, табл. LXXIV, фиг.1а-в (экз.195-2).
Центральный Салаир, Верхнебердский бассейн, окрестности пос.
Октябрьского, мочегинская свита.

Оригинал - ИГиГ, № 68I/56, табл.XXVIII, фиг.2а-в (экз.Т-445-81).

Горный Алтай, окрестности с.Соловьи, лог Хомичев.
Ремневский горизонт.

Н.В.Миронова, 1974, с.60.

Нижний девон.

Dictyofavosites nagorskyi Mironova

Оригинал - ИГиГ, № 72/5I, табл.XXI, фиг.1б,в.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.53-54.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, канава у северного края Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Dictyofavosites rotundatus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 682/12, табл.II, фиг.1а,б (экз.42-1).

Н.В.Миронова, 1961, с.154.

Центральный Салаир, Вернебердский бассейн, рч.Западный Мо -
чег.

Нижний девон, мочегинские слои.

Dictyofavosites rotundatus Mironova

Оригиналы - ИГиГ, № 681/51, табл.VI, фиг.1а-в (экз.33-101).

Окрестности с.Камышенки, левобережье р.Камышенки.

681/52, табл.VII, фиг.1а,б (экз. А 513-28).

Окрестности с.Сибирияхи, правый берег р.Ануй, в 700 м выше
устья р.Сибирики.

681/53, табл.VII, фиг.2а,б (экз.590-1).

Левый склон долины р.Ануй, ниже устья р.Сибирики.

681/54, табл.XVII, фиг.3а-в (экз. А 502-51).

Правый склон долины р.Ануй, в 1 км выше устья р.Сибирики.

681/55, табл.XXIX, фиг.1а-в (экз. 185б-1).

Окрестности с.Соловьиhi, лог Хомичев.

Н.В.Миронова, 1974, с.59.

Горный Алтай.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Dictyofavosites rotundus Mironova

Оригиналы - ИГиГ, № 72/48, табл.XX, фиг.1в.

72/50, табл.XX, фиг.3а,б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.52-53.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, юго-восточ-
ный борт Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Dictyofavosites salairicus Tchernychev

Оригинал - ИГиГ, № 681/49, табл.XXVI, фиг.2а,б (экз.185б-11).

Н.В.Миронова, 1974, с.57.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьиhi, лог Хомичев.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Echynopora elegans Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/34, табл.ХІ, фиг.3а,б.

В.Н.Дубатов, 1969, с.32.

Среднее течение р.Колымы, правый берег, Верхний Половинный камень, выше пос. Вяткино.

Средний девон, эйфельский ярус.

Echynopora elegans Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/II, табл.Х, фиг.Іа-в.

Оригинал - ИГиГ, № 400/І3, табл.Х, фиг.4.

В.Н.Дубатов, 1972, с.64-66.

Среднее течение р.Колымы, правый берег, выше пос. Вяткино, Верхний Половинный камень.

Средний девон, эйфельский ярус.

Echynopora omolonica Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/2I, табл.VIII, фиг.Іб,г.

В.Н.Дубатов, Н.Я.Спасский, 1964, с.130.

Северо-Восток СССР, хребет Уш-Уракчан, водораздел р. Талалах и руч. Глухариного.

Средний девон, живетский ярус.

Echynopora omolonica Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 290/І0а, табл.ІУ, фиг.3а-д;табл.V,фиг.Іа-г.

В.Н.Дубатов, Р.Е.Алексеева, 1967, с.27.

Пе́жжинский хребет, левобережье р.Большой Удупкин, в 5 км к северо-востоку от обн. І70.

Средний девон, эйфельский ярус.

Echynopora omolonica Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/33, табл.ХІ, фиг.2а-г.

В.Н.Дубатов, 1969, с.33.

Хребет Уш-Уракчан, правобережье р.Талалах, водораздел ручьев Талалах и Глухариного в 2,2 км к северо-западу от высоты 403,3.

Средний девон.

Egosiella crassiramosa Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/129, табл. XLIV, фиг. 1а, б (экз. Т-6а - 63).

Н.В. Миронова, 1974, с. 95.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьиhi, правый склон долины кл. Ганина, у бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Egosiella cylindrocellularis Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/130, табл. LXV, фиг. 2а, б (экз. 28-97).

68I/131, табл. LXV, фиг. 3а, (экз. 28-96).

68I/132, табл. LXV, фиг. 4 (экз. 5а-1).

Н.В. Миронова, 1974, с. 162.

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Гурьевский холм.

Нижний девон, салаиркинский горизонт.

Egosiella ganinensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/126, табл. XLIII, фиг. 1б-д (экз. Г-18-231).

Окрестности с. Соловьиhi, левобережье кл. Ганина, в 0,7 км выше бывшего пос. Киреевского.

Оригинал - ИГиГ, № 68I/127, табл. XLII, фиг. 4а, б (экз. А-509-97).

Правобережье р. Ануй, окрестности с. Сибириячиhi.

Н.В. Миронова, 1974, с. 94.

Горный Алтай.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Egosiella grandis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/128, табл. XLIV, фиг. 2 (экз. Т-30-52).

Н.В. Миронова, 1974, с. 94.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьиhi, правый склон долины кл. Ганина, в 0,5 выше бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Egosiella lecomptei Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/I20, табл. XLVI, фиг. 5а-б (экз. Т-6-40).

Н.В.Миронова, 1974, с.91.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьиhi, правый склон кл. Ганина, у бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Egosiella microalveolata Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/I2I, табл. XLIV, фиг. 4а,б (экз. Т-5г-4).

Н.В.Миронова, 1974, с.92.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьиhi, правый склон кл. Ганина, 0,3 км ниже бывшего пос.Киреевского

Нижний девон, киреевский горизонт.

Egosiella parallela Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/I25, табл. XLV, фиг. 4а,б (экз. А-6I-2I).

Н.В.Миронова, 1974, с.93.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьиhi, правобережье кл. Ганина, правый борт лога Матвеевского (у его устья).

Нижний девон, киреевский горизонт.

Egosiella pulchra Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/III, табл. XXXVIII, фиг. 5а,в; табл. XXXIX, фиг. 2а,б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.107.

Кузнецкий бассейн, левый берег р.Ур в с.Новопестерево, около зерносушки.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Egosiella vulgaris Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/I22, табл. XLIII, фиг. 2 (экз. А-234-I).

Горный Алтай, окрестности с.Соловьиhi, Хомичев лог.

Киреевский горизонт.

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/I23, табл. LXXVII, фиг. 3 (экз. 2-5).
68I/I24, табл. LXXVIII, фиг. 2б, в, д (экз. 34-22).

Салаир, окрестности г. Гурьевска, близ железнодорожного моста
через р. Салаирку. Малобачатский известняк.

Н. В. Миронова, 1974, с. 92.

Нижний девон.

Egosiella yanetae Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/II9, табл. XLV, фиг. Ia, б (экз. T-I0).

Н. В. Миронова, 1974, с. 91.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьи, правый склон долины
кл. Ганина, выше бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Egosiella helenae (Dubatolov)

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/II7, табл. LXVI, фиг. 3а, б (экз. AI06-
I69).

Окрестности с. Барагаш, правобережье р. Куваш. Кувашский гори-
зонт.

68I/II8, табл. XLV, фиг. 2а, б (экз. T I0-I53).

Окрестности с. Соловьи, правый склон кл. Ганина.

Киреевский горизонт.

Н. В. Миронова, 1974, с. 90.

Горный Алтай.

Нижний девон.

Emmonsia globosa Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/53, табл. XXI, фиг. 3а-д.

В. Н. Дубатов, 1963, с. 55-57.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Салаирки, Малосалаиркинский
карьер.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Emmonsia globosiformis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 544/7, табл. IV, фиг. I.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.97.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, Кржковская свита.

Средний девон, кржковская свита.

Favosites acrospinosus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/II, табл.V, фиг.2а,б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.12-13.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, Гурьевский карьер, восточная стена.

Нижний девон, крековские слои.

Favosites acutus Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/I7, табл.VI, фиг.3,4 (обр.205/8).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.54.

Сибирская платформа. р. Горбйячин.

Нижний силур, лландовери.

Favosites admirabilis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/3, табл.II, фиг.1а-д.

В.Н.Дубатов, 1963, с.10-12.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, северная стена Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Favosites

Оригинал - ИГиГ, № 337/63, табл.XXVII, фиг.1б-г.

337/64, табл.XXVII, фиг.2.

Бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

337/65, табл.XXVII, фиг.3а,б.

Правый берег р.Датна вторая, в 3 км выше среднего устья.

В.Н.Дубатов, 1969, с.53-55.

Хребет Тас-Хаяхта.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites altaicae Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/6, табл. XXX, фиг. 1а, б (экс. Д-139-2/852).

Н.В. Мironova, 1965, с. 132.

Горный Алтай, левый склон р. Ануй, близ с. Черный Ануй.
Верхний силур, лудлов, чалырская свита.

Favosites basalticus Goldfussi

Оригиналы - ИГиГ, № 400/10А, табл. IX, фиг. 3а, б.

В.Н. Дубатов, 1972, с. 58-60.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, левобережье р. Догдо, верховья р. Халим, в 0,9 км к юго-востоку от руч. Красивого.
Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинская свита.

Favosites bogdanovi Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/10, табл. III, фиг. 1а, б.

В.Н. Дубатов, 1969, с. 21.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало, в 0,4 км выше устья руч. Глубокого.
Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинская свита.

Favosites borealis Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 260/20, табл. VII, фиг. 3, 4 (обр. 77/2).

Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков, 1963, с. 57.

Сибирская платформа, р. Летаяя.
Нижний силур, венлок.

Favosites brevisetatus Smirnova

Оригиналы - ИГиГ, № 337/98, табл. XI, фиг. 1а-д.

337/99, табл. XI, фиг. 2.

Северо-Восток СССР. Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало, Коралловые ворота.
Нижний девон, датчинская свита.

Favosites brusnitsinii Peetz

Оригиналы - ИГиГ, № 359/1, табл. I, фиг. Ia-д.

359/2, табл. I, фиг. 2.

Д.П.Авров, В.Н.Дубатов, 1969, с.16-18.

Рудный Алтай, хребет Сарымсақты, правый берег р.Бухтармы,
3 км выше устья р.Сарымсақты.

Нижний девон, сарымсактинская свита

Favosites catenatus Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 302/1, табл. I, фиг. I, 2 (обр. 224/11).

Оригиналы - ИГиГ, № 302/2, табл. I, фиг. 3 (обр. 224/13).

302/3, табл. II, фиг. 3 (обр. 225/14).

302/4, табл. II, фиг. 4 (обр. 225/10).

Ю.И.Тасаков, 1965, с.16.

Сибирская платформа, р. Горбынчин.

Нижний силур, низы верхнего лландонери.

Favosites clausi Ganet

Оригиналы - ИГиГ, № 337/96, табл. XL, фиг. Ia, б.

337/97, табл. XL, фиг. 2a-г.

В.Н.Дубатов, 1969, с.72-73.

Среднее течение р.Колмы, правый берег, в 15 км ниже устья
р. Шаманихи.

Нижний девон, наголимский горизонт.

Favosites clerbispirinus Mironova

Оригинал - ИГиГ, № 72/35, табл. XI, фиг. 2a-г.

В.Н.Дубатов, 1963, с.14-16.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черной Батат, северная
стена Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Favosites conspicuus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/100, табл. XLII, фиг. Ia-д.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

Оригинал - ИГиГ, № 337/101, табл. XLII, фиг.2.

Хребет Сетте-Дабан, руч.Тихий.

В.Н.Дубатов, 1969, с.74-76.

Северо-Восток СССР.

Нижний девон, нижнесеттедабанский горизонт.

Favosites crebespinus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689/I, табл. D- I7, фиг.4а-б (экз.49-I).

В.Н.Дубатов, Н.В.Миронова, 1960, с.350.

Центральный Салаир, рч.Западный Мочег.

Нижний девон, мочегинские слои.

Favosites curicus Rukhin

Неотип - ИГиГ, № 337/88, табл.XXXVII, фиг.2; табл.XXXVIII, фиг. 1а,б.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/89, табл.XXXVII, фиг.3.

337/90, табл.XXXVIII, фиг.2а,б.

337/91, табл.XXXVIII, фиг.3а,б.

337/92, табл.XXXVIII, фиг.4.

337/93, табл.XXXVIII, фиг.5.

В.Н.Дубатов, 1969, с.69-70.

Северо-Восток СССР, среднее течение р.Колымы, правый берег, в 15 км ниже устья р.Шаманихи.

Нижний девон, нелюдимский горизонт.

Favosites difformis Chekhovich

Оригинал - ИГиГ, № 72/1а,б, табл.I, фиг.1а-ж.

В.Н.Дубатов, 1963, с.6-8.

Кузнецкий бассейн, правобережье р.Черневой Бачат, к юго-востоку от карьера Вторая сопка, в 400 м к ЮВ 120° от безымянного озера.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

Favosites diffusus Tesakov et Chekhovich

Голотип - ИГиГ, № 302/9, табл.IV, фиг.I,2 (обр.3055/I-I).
Оригинал - ИГиГ, № 302/10, табл.IV, фиг.3,4 (обр.3034/I).
Ю.И.Тесаков, 1965, с.17.
Средняя Азия, Атбашинский хребет, р.Ширикты.
Нижний девон.

Favosites dilutus Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 261/2, табл.XXVI, фиг.3,4 (обр. I48).
Оригинал - ИГиГ, № 261/3, табл.XXVI, фиг.5 (обр.I48a).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.128.
Северо-Восток СССР, бассейн р.Колымы, р. Тирехтях.
Нижний силур, ланцовери.

Favosites effusus Klaamann

Оригинал - ИГиГ, № 549/4, табл.XVIII, фиг.Ia,б (экз.А-84).
Н.В.Миронова, 1978, с.108.
Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, левобережье р.Черги.
Верхний силур, марагдинская свита.

Favosites fedotovi Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 72/10, табл.V, фиг.Iб,в.
В.Н.Дубатовлов, 1963, с.17-19.
Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, в 250 м к северо-востоку от бывшей Крековской мельницы.
Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Favosites cf. *goldfussi* d'Orbigny

Оригинал - ИГиГ, № 290/I, табл.III, фиг.Ia,б.
В.Н.Дубатовлов, Р.Е.Алексеева, 1967, с.23-24.
Пенжинский хребет, левобережье р.Большой Удупкин в верховье Безмянного ручья.
Средний девон, эйфельский ярус.

Favosites goldfussi multiforatilis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/9, табл.VIII, фиг.2a-д.

В.Н.Дубатов, 1972, с.55-57.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правый берег р.Хобочало, в 0,3 км выше устья руч. Глубокого.

Средний девон, хобочалинский горизонт.

Favosites gothlandicus Lamarck var. *taimyrica* Tchernychev

Оригинал - ИГиГ, № 261/7, табл.ХХVII, фиг.6,7 (обр. 128).

Б.С.Соколов, Д.И.Тесаков, 1963, с.129.

Бассейн р.Колымы, р. Тирехтях.

Нижний силур, лландовери.

Favosites graciosus Rukhin

Неотип - ИГиГ, № 337/80, табл.ХХХIV, фиг.1а-г.

В.Н.Дубатов, 1969, с.64-65.

Среднее течение р. Колымы, правый берег р. Колымы, в 15 км ниже р. Шаманихи.

Нижний девон, нелюдимский горизонт.

Favosites? hidensiformis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 682/I, табл.У, фиг.1а,б (экз.130-13).

Н.В.Миронова, 1961, с.149.

Салаир, р. Уксунай, в 150 м выше р. Большой Речки.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Favosites humilis Sokolov

Оригиналы - ИГиГ, № 690/I, табл.1, фиг.3 (К 3675-9).

Окрестности г.Гурьевска, Толсточи́хинский карьер.

690/2, табл.1, фиг.4 (экз. 1167-12).

Окрестности пос. Артышты.

В.И.Краснов, Н.В.Миронова, В.Ф.Асташкина, 1978, с.88.

Салаир.

Верхний силур, сухая свита.

Favosites humilis Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 549/5, табл.ХVIII, фиг.2 (экз.А 97-22).

Н.В.Миронова, 1978, с.108.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, левобережье р.Черги.
Верхний силур, черноануйская свита.

Favosites cf. kemali Heritsch et Gaertner

Оригинал - ИГиГ, № 261/10, табл. XXVIII, фиг. 5, 6 (экз. 164д).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.133.

Бассейн р.Колымы, р. Тирехтях.

Верхний силур, лудлов.

Favosites kolumensis Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 337/104, табл. XLIII, фиг. 3; табл. XLIV, фиг. 1а, б.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 77-78.

Северо-Восток СССР, хребет Сетте-Дабан, руч. Тихий.

Нижний девон, нижнесеттедабанский горизонт.

Favosites kozlovi Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 544/2, табл. II, фиг. 1а, б.

Оригиналы - ИГиГ, № 544/1, табл. I, фиг. 1а, б.

544/3, табл. II, фиг. 2.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с. 95.

Рудный Алтай, район г. Лениногорска, Крюковская сопка, отвалы бывшего Крюковского рудника.

Средний девон, крюковская свита.

Favosites kunjakensis Chekhovich

Оригиналы - ИГиГ, № 72/2, табл. I, фиг. 2а, б.

Левый берег р. Кара-Чумыш, в 0,5 км выше дер. Кара-Чумыш.

72/4, табл. II, фиг. 2б, в.

Р. Томь-Чумыш, в районе с. Томского.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с. 8-9.

Кузнецкий бассейн.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

Favosites mamuilatus Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 302/14, табл.III, фиг.7 (обр.90I).
Ю.И.Тесаков, 1965, с.15.
Северо-Восток СССР, Верхоянский хребет.
Верхний силур, лудлов.

Favosites mamuilatus Tchernyshev

Оригиналы - ИГиГ, № 337/66, табл.XXVIII, фиг.1г,ж.
337/67, табл.XXIX, фиг.1б-г.

В.Н.Дубатов, 1969, с.55.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобоча-
ло, Коралловые ворота.

Нижний девон, нелюдимский горизонт.

Favosites moyeroensis Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/19, табл.VII, фиг.1,2 (обр.68).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.56.

Сибирская платформа, р. Мойеро.

Нижний силур, венлок.

Favosites(?) multiformis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/12, табл.VI, фиг.1в-д; табл.VII, фиг.
1а, г, 2а-в.

В.Н.Дубатов, 1963, с.19-20.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, юго-запад-
ный край канавы, расположенный у северного края Гурьевского
карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Favosites multiplicatus Yanet

Оригинал - ИГиГ, № 259/II, табл.XI, фиг.4.

В.Н.Дубатов, 1961, с.77.

Юго-западная окраина Кузнецкого бассейна, левый берег р.Чер-
невой Бачат.

Нижний девон, крековские слои.

Favosites nikiforovae Chekhovich

Оригинал - ИГиГ, № 72/45, табл. XIX, фиг. I.

В.Н.Дубатовол, 1963, с.9.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, юго-восточный борт Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Favosites oblongus Rukhin

Неотип - ИГиГ, № 337/81, табл. XXXV, фиг. Ia-г.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/82, табл. XXXV, фиг. 2.

337/83, табл. XXXV, фиг. 3.

В.Н.Дубатовол, 1969, с.65-67.

Среднее течение р.Колымы, правый берег р.Колымы, в 15 км ниже устья р.Шаманихи.

Нижний девон, нелюдимский горизонт.

Favosites parastriatoporoides Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/5, табл. III, фиг. Iб, в.

Оригинал - ИГиГ, № 72/6, табл. III, фиг. 2б-г.

В.Н.Дубатовол, 1963, с. I3-I4.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, северо-восточная часть Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Favosites patens Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 302/8, табл. III, фиг. I, 2, 7 (обр. 226/I).

Ю.И.Тесаков, 1965, с. I7.

Сибирская платформа, р. Горбиячин.

Нижний силур, верхний лландовери.

Favosites polaris Chekhovich

Оригинал - ИГиГ, № 337/87, табл. XXXVII, фиг. Ia-г.

В.Н.Дубатовол, 1969, с.68-69.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхтах, р.Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites praemaximus Sokolov

Оригиналы - ИГиГ, № 261/5, табл. XXVII, фиг. 2, 3 (обр. 152).

261/6, табл. XXVII, фиг. 4, 5 (обр. 151).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. 131.

Бассейн р. Колымы, р. Тирехтах.

Нижний силур, лландовери.

Favosites pseudoforbessi muratsiensis Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 690/3, табл. I, фиг. 5а, б (экз. К 3675-12).

В.И.Краснов, Н.В.Миронова, В.Ф.Асташкина, 1978, с. 88.

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Толсточихинский карьер.

Верхний силур.

Favosites pseudosocialis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/76, табл. XXXIII, фиг. Ia-в.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/77, табл. XXXIII, фиг. 2а.

337/78, табл. XXXIII, фиг. 3.

337/79, табл. XXXIII, фиг. 4б.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 62-64.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхтах, левый берег р. Халим, в 1,45 км выше устья руч. Пологого.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites robustus Lecompte

Оригинал - ИГиГ, № 400/14, табл. IX, фиг. Ia-в.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с. 57-58.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхтах, левобережье р. Хобочало, левый берег руч. Глубокого, в 0,3 км выше устья.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

Favosites shengi Lin

Оригиналы - ИГиГ, № 72/8, табл. IV, фиг. 2.

72/9, табл. IV, фиг. 3а-в.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с. 16-17.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, совхоз ГМЗ, канава, расположенная в 200 м к СВ от бывшей Крековской мельницы.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Favosites shengi minor Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/1, табл.1, фиг.1а-г.

В.Н.Дубатов, Н.Я.Спаский, 1964, с.112.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, в районе г. Гурьевска.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Favosites socialis Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 261/8, табл.ХХVII, фиг.8; табл.ХХVIII, фиг.1, 2 (обр.166/1).

Паратип - ИГиГ, № 261/9, табл.ХХVIII, фиг.3,4 (обр.166/5).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.132.

Бассейн р.Колымы, р. Тирехтах.

Верхний силур, лудлов.

Favosites socialis Sokolov et Tesakov

Оригинал - ИГиГ, № 690/4, табл.1, фиг.1а,б (экз.К 3675-II).

В.И.Краснов, Н.В.Миронова, В.Ф.Асташкина, 1978, с.88.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, Толсточихинский карьер.

Верхний силур, сухая свита.

Favosites socialis Sokolov et Tesakov forma heterostila Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 248/4, табл.II, фиг.2а-в.

248/4а, табл.II, фиг.3.

В.Н.Дубатов, Н.Я.Спаский, 1964, с.116.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхтах, бассейн р. Догдо, правый берег р.Хобочало, среднее течение, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites socialis Sokolov et Tesakov forma *heterostila*

Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 337/71, табл. XXXI, фиг. 1а, б.

Левый берег р. Халим, в 1,45 км выше устья руч. Пологого.

337/74, табл. XXXI, фиг. 4.

Правый берег р. Хобочало, Коралловые ворота.

В.Н. Дубатолов, 1969, с. 61-62.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites socialis Sokolov et Tesakov forma *laeta* Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 248/3, табл. II, фиг. 1а-г.

В.Н. Дубатолов, Н.Я. Спасский, 1964, с. II 5.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало, среднее течение, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites socialis Sokolov et Tesakov forma *patteiformis*

Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/68, табл. XXIX, фиг. 2б-г.

В.Н. Дубатолов, 1969, с. 57-59.

Северо-Восток СССР, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало, среднее течение, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites socialis Sokolov et Tesakov forma *typica* Sokolov et

Tesakov

Оригинал - ИГиГ, № 248/2, табл. I, фиг. 2а-д.

В.Н. Дубатолов, Н.Я. Спасский, 1964, с. II 3.

Северо-Восток СССР, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало, среднее течение, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites socialis Sokolov et Tesakov forma typica Sokolov et
Tesakov

Оригинал - ИГиГ, № 337/69, табл. XXX, фиг. Ia-г.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.59-60.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо,
правый берег р.Хобочало, среднее течение, Коралловые ворота.
Нижний девон, датнинская свита.

Favosites sulcatus Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 261/4, табл. XXVI, фиг. 6; табл. XXVII, фиг.
7 (обр. I50).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. I30.

Бассейн р. Колымы, р. Тирехтях.

Нижний силур, лландоверия.

Favosites suspectus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/84, табл. XXXVI, фиг. Ia-в.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/85, табл. XXXVI, фиг. 2а-г.

337/86, табл. XXXVI, фиг. 3.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 67-68.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо,
левый берег р.Халим, в 1,45 км выше устья руч. Пологого.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites syvjuensis yacuticus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/102, табл. XLIII, фиг. Ia-д.

Оригинал - ИГиГ, № 337/103, табл. XLIII, фиг. 2.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 76-77.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, пра-
вый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Favosites vectorius Klaemann

Оригиналы - ИГиГ, № 549/2, табл. XVI, фиг. 2а, б (экз. А 84-Г).

549/3, табл.ХVI, фиг.3 (экз. А 84/1а).

Н.В.Миронова, 1978, с.107.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануи, левобережье р.Черги.

Верхний силур, марагдинская свита.

Favosites yermolaevi Tchernyshev

Оригиналы - ИГиГ, № 337/94, табл.ХХХIX, фиг.1а-д.

337/95, табл.ХХХIX, фиг.2.

В.Н.Дубатов, 1969, с.70-71.

Среднее течение р. Колымы, правый берег, в 1,5 км ниже устья р.Шаманихи.

Нижний девон, нелюдимский горизонт.

Favosites yermolaevi Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 549/1, табл.ХVI, фиг.1а,б (экз.А-85).

Н.В.Миронова, 1978, с.107.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануи, левобережье р.Черги.

Верхний силур, марагдинская свита.

Favosites sp.

Оригинал - ИГиГ, № 259/8, табл.ХI, фиг.1.

В.Н.Дубатов, 1961, с.77.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правый берег р.Хобочало.

Средний девон, эйфельский ярус.

Favosites sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 302/II, табл.1, фиг.4,5 (обр. 32/1).

Река Чунку.

302/5, табл.II, фиг.5 (обр.224/43).

302/6, табл.II, фиг.6 (обр.224/45).

302/12, табл.III, фиг.3,4 (обр.226/15).

302/13, табл.III, фиг.5,6 (обр.224/61).

Р. Горбиячин.

Ю.И.Тесаков, 1965, с.15.
Сибирская платформа.
Нижний силур, верхний лландоверий.

Gephuropora crebrispinosa (Mironova)

Голотип – ИГиГ, № 68I/65, табл. LXIX, фиг. I (экз. 49-I).
Н.В.Миронова, 1974, с.48.
Центральный Салаир, Верхнебердский бассейн, р. Западный Мочег.
Нижний девон, мочегинская свита.

Gephuropora etheridgei Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 72/28, табл. XII, фиг. 2а-д.
Оригинал – ИГиГ, № 72/27, табл. XII, фиг. I.
В.Н.Дубатов, 1963, с.31-32.
Кузнецкий бассейн, р. Черновой Бачат, в совхозе ГМЗ, в 250 м
северо-востоку от бывшей Крековской мельницы.
Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Gephuropora etheridgei Mironova

Оригиналы – ИГиГ, № 68I/29, табл. LVIII, фиг. 2а, б (экз. А
102-43).
Горный Алтай, окрестности с. Барагаш, правобережье р. Куваш.
Кувашский горизонт.
68I/30, табл. LIX, фиг. 1а, б (экз. 9-4).
Салаир, окрестности г. Гурьевска, Гурьевский холм.
Салаиркинский горизонт.
Н.В.Миронова, 1974, с.45.
Нижний девон.

Gephuropora(?) *paleoforma* Mironova

Голотип – ИГиГ, № 68I/32, табл. XXIII, фиг. 1а, б (экз. I85а-25).
Оригинал – ИГиГ, № 68I/33, табл. XXIII, фиг. 2а, б (экз. 74-30).
Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, правый склон лога Хо-
мичева.
Н.В.Миронова, 1974, с.46.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Gephurogona parvula Mironova

Оригинал - ИГиГ, № 688/1а,б, табл.XIV, фиг.2а,б (экз.II-23).
Н.В.Миронова, 1971, с.43.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, левый берег рч. Малый Ба -
чат, у бывшей Крековской мельницы.

Нижний девон, крековский горизонт.

Gephurogona parvula Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/31, табл.XIX, фиг.1а,б (А 61-4).
Н.В.Миронова, 1974, с.46.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, правобережье кл.Гани -
на, правый борт лога Матвеева.

Нижний девон, ганинская свита.

Gephurogona rudispinosa Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/37, табл.XXII, фиг.2а,б (Т-74-1).

Окрестности с.Соловьихи, правый склон лога Хомичева.

Оригинал - ИГиГ, № 681/36, табл.XXII, фиг.1а-в (А 509-109).

Окрестности с.Сибирячихи, правый берег р.Ануй.

Н.В.Миронова, 1974, с.47

Горный Алтай.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Gephurogona sibirica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/35, табл.XXI, фиг.1а,б (Т 445-103).

Лог Хомичев. Ремневский(?) горизонт.

Оригинал - ИГиГ, № 681/34, табл.XX, фиг.1а,б (Г 8-13).

Левобережье кл.Ганина. Киреевский горизонт.

Н.В.Миронова, 1974, с.47.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи.

Нижний девон.

Gerrhinopora sp.

Оригинал – ИГиГ, № 337/29А, табл.VIII, фиг.1а,б.

В.Н.Дубатов, 1969, с.29.

Кузнецкий бассейн, район г.Гурьевска, левобережье р.Черно –
вой Бачат, Гурьевский карьер.

Нижний девон, крековские слои.

Grabaulites dubovicovi Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 337/163, табл.LXVII, фиг.1а-в.

В.Н.Дубатов, 1969, с.122.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правый берег р.Хобо-
чало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Grabaulites omoloniensis Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 400/3, табл.II, фиг.1а,б.

Паратип – ИГиГ, № 400/3А, табл.II, фиг.2а,б.

В.Н.Дубатов, 1972, с.39-40.

Северо-Восток СССР, хребет Уш-Уракчан, левый берег р.Талалах,
около руч. Ледяного.

Средний девон, живетский ярус, леденинские слои.

Grabaulites salairicus Mironova

Голотип – ИГиГ, № 681/153, табл. LXXXI, фиг.1а,б (экз.1167-
33).

Н.В.Миронова, 1974, с.110.

Восточный склон Салаира, окрестности ст.Артышты – пос. Вул –
кан.

Нижний девон, сухая свита.

Gracilopora(?) abnormis Mironova

Голотип – ИГиГ, № 681/100, табл.XII, фиг.2а,б (экз.Г 33-153).

Н.В.Миронова, 1974, с.74.

Горный Алтай, окрестности с.Камышенки, в 200 м на юго-восток

от горы Колпак.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Gracilopora acuta Tchudinova

Оригиналы - ИГиГ, № 544/31, табл. XI, фиг. 1а-в.

544/32, табл. XI, фиг. 2.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с. 109.

Рудный Алтай, район г. Лениногорска, Андреевский карьер, южный борт, высотная отметка 880-900 м.

Средний девон, эйфельский ярус, сокольная свита.

Gracilopora altaica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/103, табл. XXXIX, фиг. 5а,б (экз. Т 29-74)
Н.В.Миронова, 1974, с. 75.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, правый склон кл. Ганина, в 0,5 км выше бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Gracilopora ganinensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/104, табл. XLVI, фиг. 1а-в (экз. Т-32).
Н.В.Миронова, 1974, с. 75.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, правый склон долины кл. Ганина, в 0,5 км выше бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Gracilopora minima Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/102, табл. XLVI, фиг. 2а,б (экз. Т 6а-99).

Н.В.Миронова, 1974, с. 74.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, правый склон долины кл. Ганина, у бывшего пос. Киреевского.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Gracilopora nana (Dubatolov)

Оригиналы - ИГиГ, № 337/153, табл. LXIII, фиг. 1а,б.

337/I54, табл. LXIII, фиг.2а,б.

337/I55, табл. LXIII, фиг.3а.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.112-113.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита.

Gracilopora tenera Koksharskaja

Оригинал - ИГиГ, № 400/45, табл. XXI, фиг.2а-в.

В.Н.Дубатовлов, с.85,86.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, левобережье р.Догдо, правый берег р.Халим, в 350 м выше устья руч. Красивого.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

Gracilopora yavorskyi (Dubatolov)

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/98, табл. LXII, фиг.2а,б (экз.4б-44).

68I/99, табл. LXII, фиг.3а-б (экз. IIа-32).

Н.В.Миронова, 1974, с.72.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, Гурьевский холм.

Нижний девон, салаиркинские слои.

Halysites densus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/I3, табл. XXXIII, фиг. Iа,б (экз. 2246 - I/85I).

Н.В.Миронова, 1965, с.136.

Восточный Салаир, левый берег р.Уксунай, в 2 км ниже устья р. Большой Речки.

Верхний силур, лудлов, баскуская свита.

Halysites hamadai Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689а/I8, табл. s -I6, фиг. Iа,б (экз. I0076).

П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.72.

Юго-западное Присалаирье, окрестности д.Зырянки.

Верхний силур, лудлов, баскуская свита.

Halysites parvus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689а/19, табл. S - I5, фиг. 4а, б (экз. 5-3).

П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с. 72.

Восточный склон Салаира, район д. Бачаты.

Верхний силур, лудное, баскуская свита.

Halysites pseudoorthopteroideus Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 689а/17, табл. S - I5, фиг. 3а, б (экз. 407-2).

П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с. 72.

Горный Алтай, окрестности с. Черный Ануй, правый берег р. Черги, близ устья 2-го ключа.

Верхний силур, чагырская свита.

Heliolites ambiguus Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 72/123, табл. XLII, фиг. 1а-г.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 114-115.

Кузнецкий бассейн, в 0,4 км к северу от западного конца дер. Мамонтово.

Нижний девон, крековские слои.

Heliolites jejunus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/125, табл. XLIII, фиг. 1а-в.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 117-118.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Салаирки, 16-я разведочная линия, шурф 26.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Heliolites tchergaensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689а/20, табл. S - I6, фиг. 2а, б (экз. 411-1).

П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с. 73.

Горный Алтай, правый борт рч. Черги, близ с. Черный Ануй.

Верхний силур, чагырская свита.

Heliolites uksunayensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 682/18, табл.УІ, фиг.3а,б (экз.І30-6І).

Н.В.Миронова, 1961, с.158.

Салаир, правый берег р.Уксунай, в 150 м выше устья р.Большой Речки.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Heliolites vulgaris Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 259/4, табл.Х, фиг.4.

В.Н.Дубатов, 1961, с.76.

Юго-западная окраина Кузнецкого бассейна, левобережье р.Салаирки.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Heliolites vulgaris Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 259/10, табл.ХІ, фиг.3.

В.Н.Дубатов, 1961, с.77.

Юго-западная окраина Кузнецкого бассейна, левобережье р.Са - лаирки.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Heliolites vulgaris Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 72/124, табл.ХІІ, фиг.2б,в.

В.Н.Дубатов, 1963, с.115-116.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Салаирки, 2І-я разведочная линия, шурф І30.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Heliolites sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 259/3, табл.Х, фиг.3.

259/5, табл.Х, фиг.5.

Правобережье р.Черневой Бачат, район д.Акарачкино.

259/7, табл.Х, фиг.7.

С.Новопестерево.

В.Н.Дубатов, 1961, с.76.

Юго-западная окраина Кузнецкого бассейна.

Средний девон, эйфельский ярус, мамонтовские слои.

Hillaerpora altaica Dubatolov

Голотип – ИГиГ, № 248/13, табл.VII, фиг.3а-в.

Оригиналы – ИГиГ, № 248/14, табл.VII, фиг.4.

248/15, табл.VII, фиг.5.

248/16, табл.VII, фиг.6.

В.Н.Дубатов, Н.Я.Спасский, 1964, с.127.

Южный Алтай, хребет Листвяжный, левый берег р.Белой, в 6 км выше ее устья.

Средний девон, эйфельский ярус, култабарская свита.

Hillaerpora altaica Dubatolov

Оригиналы – ИГиГ, № 359/14, табл.III, фиг.1а-г.

359/16, табл.III, фиг.3.

359/17, табл.III, фиг.4.

359/18, табл.III, фиг.5.

359/19, табл.III, фиг.6.

Д.П.Авров, В.Н.Дубатов, 1969, с.21-22.

Южный Алтай, хребет Листвяга, левый берег р.Белой, в 900 м выше устья рч.Околееха.

Нижний девон, сарымсактинская свита.

Hillaerpora spica Mironova

Голотип – ИГиГ, № 684/2, табл.XI, фиг.2 (экз.1167-31).

Н.В.Миронова, 1960, с.98

Салаир, дер.Бачаты.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Klaamannipora altaica Mironova

Голотип – ИГиГ, № 549/16, табл.XIX, фиг.4а-в (экз. А 97-2).

Н.В.Миронова, 1978, с.III.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, левобережье р.Черги.

Верхний силур, черноануйская свита.

Laceripora salairica Mironova

Голотип – ИГиГ, № 685/7, табл.XXXI, фиг.2а,б (экз.2236/851).

Н.В.Миронова, 1965, с.132.

Восточный склон Салаира, правый берег р.Уксунай, в 1,5 км выше дер. Жениховки.

Верхний силур, лудлов, баскуская свита.

Lesomptia altaica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/140, табл.1111, фиг.1а-в (экз.Г II-I).
Н.В.Миронова, 1974, с.100.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьи, левобережье кл.Ганина
Нижний девон, ремневский(?) горизонт.

Lesomptia ramosa Mironova

Голотип - ИГиГ, № 683/1, табл.1, фиг.1б, 2,4,6 (экз.419-10).
Н.В.Миронова, 1961, с.178.

Салаир, левый берег р.Черновой Бачат, ниже г.Гурьевска, Гурьевский карьер.

Нижний девон, крековские слои.

Lesomptia ramosa Mironova

Оригинал - ИГиГ, № 72/117, табл. XI, фиг.2.

В.Н.Дубатов, 1963, с.82.

Салаир, левобережье р.Черновой Бачат, старый Гурьевский карьер, около железнодорожного моста через р.Салаирку.

Нижний девон, крековские слои.

Lyopora crassa Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/52, табл.XVII, фиг.5; табл.XVIII, фиг.1 (обр. 18к-1).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.86.

Сибирская платформа, р. Лена.

Средний ордовик, кривошанский ярус.

Lyopora flexibilis Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/54, табл.XVIII, фиг.3,4 (обр.18к-7).

Оригинал - ИГиГ, № 260/53, табл. XVIII, фиг. 2 (обр. 18к-3).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.87.
Сибирская платформа, р. Лена.
Средний ордовик, криволучный ярус.

Mariusilites altaicus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/145, табл. XXIV, фиг. 1а-б (экз. С 500-1).
Н.В.Миронова, 1974, с.106.
Горный Алтай, правый берег р.Ануй, против с.Сибирячихи.
Нижний девон, киреевский горизонт.

Mariusilites sibiricus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/143, табл. VIII, фиг. 1а, б (экз. А-90-157).
Горный Алтай, окрестности с.Камышенки, в 0,7 км к юго-западу от горы Колпак. Ремневский горизонт.
Оригинал - ИГиГ, № 681/144, табл. LXXVI, фиг. 2а, б (экз. 233).
Салаир, г.Гурьевск, близ железнодорожного моста через р.Салаирку. Малобачатский известняк.
Н.В.Миронова, 1974, с.105.
Нижний девон.

Mesofavosites anuensis Dziubo

Голотип - ИГиГ, № 689а/4, табл. S - II, фиг. 1а, б (экз. ф - 18/852).
П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.61.
Горный Алтай, правый берег р.Ануй, район с.Турата.
Верхний силур, подчагирская свита.

Mesofavosites dziuboe Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/2, табл. XXI, фиг. 2а, б (экз. 407-852).
Н.В.Миронова, 1965, с.129.
Горный Алтай, бассейн р.Ануй, окрестности с.Черный Ануй.
Верхний силур, лудлов, чагирская свита.

Mesofavosites ex gr. *fleximurinus* Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/16, табл. VI, фиг. I, 2 (обр. 315).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.53
Сибирская платформа, р. Мойеро.
Нижний силур, ланцовери.

Mesofavosites ganinensis Dziubo

Голотип - ИГиГ, № 689a/2, табл. S - IO, фиг. 46 (экз. I-II3-(7)).
П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.60.
Горный Алтай, р. Ганин, близ бывшего пос. Киреевского.
Верхний силур, подчагырская свита.

Mesofavosites khalfini Dziubo

Голотип - ИГиГ, № 689a/3, табл. S - IO, фиг. 2a, б (экз. I - II3(2)).
П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.60.
Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, правый берег кл. Ганина в 1,5 км ниже бывшего пос. Киреевского.
Верхний силур, подчагырская свита.

Mesofavosites leleshusi Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/5, табл. XXX, фиг. 2a, б (экз. Д-139-92-852).
Н.В.Миронова, 1965, с.128.
Горный Алтай, левый берег р.Ануй, близ с.Черный Ануй.
Верхний силур, чагырская свита.

Mesofavosites mediocris Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689a/5, табл. S - II, фиг. 3a, б (экз. 2235-5).
П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.62.
Салаир, правый берег р.Уксунай, в 1 км выше пос.Жениховского.
Верхний силур, баскуская свита.

Mesofavosites moyeroensis (Sokolov et Tesakov)

Паратип - ИГиГ, № 688/4, рис.3 (экз. 30I/2).

Н.В.Миронова, 1971, с.37.

Сибирская платформа, бассейн р.Аякли, кл.Большая Каменка.

Нижний силур, венлок.

Mesofavosites nigeranuyensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/3, табл.ХХVIII, фиг.2а,б (экз.Д-I39-I4).

Н.В.Миронова, 1965, с.130.

Горный Алтай, левый берег р.Ануй, близ с.Черный Ануй.

Верхний силур, лудлов, чагырская свита.

Mesofavosites tcherepninae Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/1, табл.ХХVIII, фиг.1а,б (экз. Д-I39-42).

Н.В.Миронова, 1965, с.128.

Горный Алтай, левый берег р.Ануй, против с.Черный Ануй.

Верхний силур, лудловский ярус, чагырская свита.

Mesofavosites tenuimurus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/4, табл.ХХIX, фиг.1а,б (экз. Д-I40 - I25-852).

Н.В.Миронова, 1965, с.131.

Горный Алтай, левый склон рч. Каракол, в 700 м от устья Ельчина лога на ССЗ.

Верхний силур, лудлов, чагырская свита.

Mesosolenia festiva (Tchernychev)

Оригинал - ИГиГ, № 260/I4, табл.У, фиг.3,4 (обр.260/53).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.51.

Сибирская платформа, северо-западная часть.

Нижний силур, венлок.

Mesosolenia festivus (Tchernychev)

Синтип - ИГиГ, № 684/I, табл. XI, фиг. Ia, б (экз. 2-29).

Н.В. Миронова, 1960, с. 96.

Салаир, левый берег р. Чумыш, гора Глядень, близ с. Сары-Чумыш.

Верхний силур, лудлов.

Mesosolenia labyrintha Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689a/I, табл. s- 9, фиг. 5a, б (экз. I37).

П.С. Дзюбо, Н.В. Миронова, 1960, с. 59.

Горный Алтай, рч. Верхняя Карасу (правый приток р. Ини).

Верхний силур, чагырская свита.

Mesosolenia prima Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/I5, табл. У, фиг. 5, 6 (обр. I45в).

Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков, 1963, с. 52.

Сибирская платформа, р. Мойеро.

Нижний силур, венлок.

Multisolenia formosa Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/II, табл. IV, фиг. 3, 4 (обр. 229/6).

Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков, 1963, с. 49.

Сибирская платформа, р. Горбиячин.

Нижний силур, лландовери.

Multisolenia labyrinthica Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/IO, табл. IV, фиг. I, 2 (обр. 225).

Б.С. Соколов, Ю.И. Тесаков, 1963, с. 48.

Сибирская платформа, р. Горбиячин.

Нижний силур, лландовери.

Multisolenia misera Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/9, табл. III, фиг. 5, 6 (обр. 3I-3a).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.47.

Сибирская платформа, р. Летняя, среднее течение.

Нижний силур, лландовери.

Multisolenia nikiforovae Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/12, табл. IV, фиг. 5, 6 (обр. 124/9).

Бассейн р. Северной, руч. Ланги.

Паратип - ИГиГ, № 260/13, табл. V, фиг. I (обр. 55е).

Р. Мойеро.

Оригинал - ИГиГ, № 260/14, табл. V, фиг. 2 (обр. 74/6).

Р. Летняя.

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.49.

Сибирская платформа.

Нижний силур, венлок.

Multisolenia tortuosa Fritz

Оригинал - ИГиГ, № 261/1, табл. XXVI, фиг. I, 2 (обр. 131).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.127.

Бассейн р. Колмы, р. Тирехтах.

Нижний силур, лландовери.

Natalophyllum pusillum Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/115, табл. XXXIX, фиг. 4; табл. XL, фиг. I.

В.Н.Дубатов, 1963, с.108-109.

Кузнецкий бассейн, левый берег р. Кара-Чумыл, в 0,5 км ниже пионерлагеря напротив дер. Кара-Чумыл.

Средний девон, эйфельский ярус, вандийские слои.

Nekhoroshevilites absolutus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 544/10, табл. V, фиг. Ia-д.

Оригиналы - ИГиГ, № 544/13, табл. VI, фиг. Ia, б.

544/14, табл. VI, фиг. 2.

544/15, табл. VI, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.99.

Рудный Алтай, район г. Лениногорска, Кривовская сопка.

Средний девон, злиховский ярус, кряковская свита.

Neoroemeria westsibirica Radugin

Оригиналы - ИГиГ, № 400/7, табл. VI, фиг. 1а, б.

400/7А, табл. VI, фиг. 2.

400/7Б, табл. VII, фиг. 1а-г.

400/7В, табл. VII, фиг. 2а, б.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с. 51-52.

Кузнецкий бассейн, северная окраина, район с. Лебедянского.

Средний девон, живетский ярус, сафоновский горизонт.

Nustopora denticulata Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/47, табл. XVI, фиг. 1, 2 (обр. 10-1).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963.

Сибирская платформа. Р. Подкаменная Тунгуска, в 2 км выше устья р. Столбовой.

Верхний ордовик, долбровский ярус.

Nustopora nicholsoni (Radugin)

Оригинал - ИГиГ, № 260/46, табл. XV, фиг. 5, 6 (обр. 167-2).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. 79.

Сибирская платформа. Р. Чуя, в 2 км выше р. В.Чуяку.

Средний ордовик, самые верхи.

Pachycanalicula dentata Mironova

Оригинал - ИГиГ, № 72/126, табл. XLIII, фиг. 2а-в.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с. 118-119.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Черневой Бачат, восточный борт Гурьевского карьера.

Нижний девон, кряковские слои.

Pachycanalicula opaca Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/127, табл. XLIII, фиг. 3б.

Район пос. Свободный и с. Сафоново, 3-я разведочная линия, шурф 54.

Эйфельский ярус, шандинские слои.

Оригинал - ИГиГ, № 72/128, табл. XLIII, фиг. 3а, 4а, б.

Изолированный холм в пос. Шандинском.

Живетский ярус, керлеговские слои.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 120-121.

Кузнецкий бассейн.

Средний девон.

Pachyfavosites abnormis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/5, табл. II, фиг. 4а-г; табл. III, фиг. Iа-в.

В.Н.Дубатов, Н.Я.Спасский, 1964, с. II 7.

Дальний Восток, Зейско-Селемджинский район, рч. Кайла.

Средний девон, эйфельский ярус.

Pachyfavosites avidus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/16, табл. VIII, фиг. 3в-д.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 22-23.

Кузнецкий бассейн, правобережье р. Черневой Бачат, северо-восточная стена Толсточижевского карьера.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумынские слои.

Pachyfavosites bystrowi Yanet

Оригинал - ИГиГ, № 72/18, табл. IX, фиг. Iа-г.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 23-24.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Черневой Бачат, канава, расположенная у северного края Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Pachyfavosites gincyngeri Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/76, табл. XXXV, фиг. Iа, б; табл. XXXVI, фиг. Iа, б (экз. Г-10-69).

Окрестности с. Соловьи, левобережье кл. Ганина.

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/77, табл. XXXVI, фиг. 2а-в (экз. А - 5II-10).

Окрестности с.Сибирячихи, правобережье р.Ануй.

68I/78, табл. XXXVIII, фиг. 1а, б (экз. А 500-1).

68I/79, табл. XXXVIII, фиг. 2а, б (экз. А 5076-39).

68I/80, табл. XXXVIII, фиг. 3а, б (экз. С 500-3).

Окрестности с.Сибирячихи, правобережье р.Ануй, в 2 км выше р.Сибирки.

Н.В.Миронова, 1974, с.65.

Горный Алтай.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Pachyfavosites hidensiformis (Mironova)

Оригинал - ИГиГ, № 337/108, табл. XLV, фиг. 3а-д.

В.Н.Дубатов, 1969, с.79-80.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, верховье р.Халим.

Нижний девон, датнинская свита.

Pachyfavosites hidensiformis (Mironova)

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/74, табл. IX, фиг. 1а, б (экз. С 556-1).

68I/75, табл. IX, фиг. 2а, б (экз. А 513а-27).

Н.В.Миронова, 1974, с.64.

Горный Алтай, окрестности с.Сибирячихи, правый берег р.Ануй, в 1 км выше устья р.Сибирки.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Pachyfavosites kozlowskii Sokolov

Оригиналы - ИГиГ, № 72/14, табл. VIII, фиг. I.

Левобережье р.Черневой Бачат, северный край Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

72/15, табл. VIII, фиг. 2.

Левобережье р.Томь-Чумыш, в 600 м ниже лесопилки.

Верхний силур, томь-чумышские слои.

В.Н.Дубатов, 1963, с.21-22.

Кузнецкий бассейн.

Pachyfavosites ex gr. *kozlowskii* Sokolov

Оригинал — ИГиГ, № 337/14, табл.IV, фиг.9.

В.Н.Дубатов, 1969, с.23.

Подолья, левый берег р.Ниглава, на южной окраине дер. Верхне-ковцы, в 1,5 км выше г.Борщева.

Нижний девон, борщевский горизонт.

Pachyfavosites markovskyi Sokolov

Оригиналы — ИГиГ, № 544/4, табл.III, фиг.1а-г.

544/5, табл.III, фиг.2.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.96.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, южный борт Андреевского карьера, на уступе с высотной отметкой 880-900 м.

Средний девон, сокольная свита.

Pachyfavosites(?) *nitella* (Winchell)

Оригинал — ИГиГ, № 72/23, табл.X, фиг.4а,б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.25.

Кузнецкий бассейн, район г.Гурьевска, Старогурьевский карьер, около железнодорожного моста через р.Салаирку.

Нижний девон, малобачатские слои.

Pachyfavosites oculiporoides Mironova

Голотип — ИГиГ, № 681/81, табл.XXXVII, фиг.1а,б (экз. А IOI-19).

Оригинал — ИГиГ, № 681/82, табл.XXXVII, фиг.2а,б (экз. А IOI-20).

Н.В.Миронова, 1974, с.65.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, лог Хомичев, в 1,5 км выше устья.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Pachyfavosites polymorphus (Goldfuss)

Оригинал — ИГиГ, № 72/19, табл.IX, фиг.2в-г.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.25.

Кузнецкий бассейн, район с.Лебедянского, лебедянский карьер.
Средний девон, живетский ярус, лебедянские слои.

Pachyfavosites preplacenta (Dubatolov)

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/62, табл.XXX, фиг.1а,б (экз.К 48а-14).

68I/63, табл.XXX, фиг.2а,б (экз. К 48-40).

Окрестности с.Соловьи, лог Комичев.

68I/64, табл.XXXIV, фиг.1а-в (экз. С 500-2).

Окрестности с.Сибириячи, р.Ануй.

Горный Алтай.

Киреевский горизонт.

68I/66, табл.LXXVII, фиг.1а,б (экз.34-12).

Г.Гурьевск, близ железнодорожного моста через р.Салаирку.

Малобачатский известняк.

68I/67, табл.LXXVI, фиг.1а,б (экз. 15-3).

Г.Гурьевск, Гурьевский холм, левобережье р.Малый Бачат.

Верхнекрековские слои.

Салаир.

Н.В.Миронова, 1974, с.62.

Нижний девон.

Pachyfavosites primus Pivovarova

Голотип - ИГиГ, № 72/134, табл.Х, фиг.5а-в.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.139.

Горный Алтай.

Верхний силур, нижняя часть чагырской свиты.

Pachyfavosites rariporosus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/20, табл.Х, фиг.1б,в.

Оригинал - ИГиГ, № 72/22, табл.Х, фиг.3.

Кузнецкий бассейн, район г.Гурьевска, Старогурьевский карьер,
около железнодорожного моста через р.Салаирку.

Нижний девон, малобачатские слои.

Pachyfavosites rariporosus Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/68, табл. XXXI, фиг. Ia, б (экз. Т 6а-63).

Окрестности с. Соловьихи, кл. Ганин.

68I/7I, табл. XXXIII, фиг. I (экз. Т 30-10).

Кл. Ганин, правый склон, в 500 м выше бывшего пос. Киреевского.

68I/69, табл. XXXI, фиг. 2а, б (экз. 32-6).

Окрестности с. Камышенки, левобережье р. Камышенки.

68I/70, табл. XXXII, фиг. Ia-в (экз. С-472-I).

Окрестности с. Сибирячихи, правобережье р. Ануй.

Горный Алтай.

Киреевский горизонт.

68I/72, табл. LXXVIII, фиг. Ia, б (экз. 233а).

Салаир, окрестности г. Гурьевска, близ железнодорожного моста через р. Салаирку.

Малобачатский известняк.

Н. В. Миронова, 1974, с. 63.

Нижний девон.

Pachyfavosites uimenensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 688/3, табл. XVI, фиг. 3а, б (экз. 7I5-7I).

Н. В. Миронова, 197I, с. 187.

Горный Алтай, бассейн р. Уймень, водораздел рек Пыжа, Уйкара-таш, Сумерлу.

Нижний девон, сумерлинская свита.

Pachyfavosites vijaicus Yanet

Оригинал - ИГиГ, № 72/I7, табл. VIII, фиг. 4.

В. Н. Дубатов, 1963, с. 26-27.

Кузнецкий бассейн, левый берег р. Кара-Чумыш, в 0,35 км к СЗ 300° от крайнего дома на нижнем конце дер. Кара-Чумыш.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Pachyfavosites ex gr. vijaicus (Yanet)

Оригинал - ИГиГ, № 68I/73, табл. XXXIV, фиг. 2 (экз. А 5076-27).

М.В.Миронова, 1974, с.157.

Горный Алтай, окрестности с.Сибирячихи, правый склон долины р. Ануй, в 2 км выше устья р.Сибирки.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Pachyfavosites yui Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 72/26, табл.ХІ, фиг.3а,б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.27-28.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Кара-Чумыш, в 200 м к западу от крайних домов в дер. Кара-Чумыш (Колода).

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Pachypora altaica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68І/2, табл.ХУІ, фиг.2а,б; табл.ХУІІ, фиг.2а, б (экз. С 58І-2).

Н.В.Миронова, 1974, с.26.

Горный Алтай, правый склон р.Ануй, ниже устья р.Сибирки, окрестности с.Сибирячихи.

Нижний девон, жединский ярус, сибиркинский горизонт.

Pachypora anuiensis Mironova

Голтип - ИГиГ, № 68І/3, табл.ХУ, фиг.Іа-в (экз.273-3).

Н.В.Миронова, 1974, с.26.

Горный Алтай, р.Ануй, окрестности с.Сибирячихи.

Нижний девон, жединский ярус, ремневский горизонт.

Pachypora cylindrica Tchernyshev

Оригиналы - ИГиГ, № 549/9, табл.ХІХ, фиг.2а,б (экз. А 90-2).

549/10, табл.ХІХ, фиг.3а-в (экз. А 97-7).

Н.В.Миронова, 1978, с.109.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, левобережье р.Черги.

Верхний силур, черноануйская свита.

Pachypora(?) krasnovi Mironova

Голотип - ИГиГ, № 690/5, табл.І, фиг.2а,б (экз. К 3675-4).

В.И.Краснов, Н.В.Миронова, В.Ф.Асташкина, 1978, с.91.
Салаир, окрестности г.Гурьевска, Толсточихинский карьер.
Верхний силур, сухая свита.

Pachypora lamellicornis Lindström

Оригинал - ИГиГ, № 337/40, табл.ХІУ, фиг.3.
В.Н.Дубатов, 1969, с.38.
Швеция, о. Готланд.
Нижний силур, венлок.

Pachypora tomchumyshensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/І, табл.ІХХХ, фиг.3а,б (экз. OT I-I).
Н.В.Миронова, 1974, с.25.
Салаир, левый берег р.Томь-Чумыш, у с.Томского.
Нижний девон, томь-чумышские слои.

Palaeofavosites angoporoides Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/7, табл.ІІІ, фиг.І,2 (обр. 608).
Оригинал - ИГиГ, № 260/8, табл.ІІІ, фиг.3,4 (обр. 607-I, 2).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.46.
Сибирская платформа, р. Мойеро.
Нижний силур, лландовери.

Palaeofavosites argutus Ivanov

Оригинал - ИГиГ, № 260/І, табл.І, фиг.І, 2(обр. 9-2І).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.40.
Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р.Н.Чунку.
Верхний ордовик, бурский горизонт.

Palaeofavosites astrovae Mironova.

Голотип - ИГиГ, № 688/2, табл.ХУ, фиг.2а,б (экз.3І).
Н.В.Миронова, 1971, с.186.
Подолья, рч.Терповы.
Силур, китайгородский(?) горизонт.

Palaeofavosites balticus (Rukhin)

Оригинал - ИГиГ, № 260/6, табл.II, фиг.5,6 (обр.49/I).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.45.
Сибирская платформа, р. Мойеро.
Нижний силур, лландовери.

Palaeofavosites carinatus Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/2, табл.I, фиг.3,4 (обр.10-3).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.41.
Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р.Н.Чунку.
Верхний ордовик, бурский горизонт.

Palaeofavosites ivanovi Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/4, табл.II, фиг.I,2 (обр. 10-4).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.43.
Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р.Н.Чунку.
Верхний ордовик, бурский горизонт.

Palaeofavosites kanuensis Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/3, табл.I, фиг.5,6 (обр.7-I).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.42.
Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р.Н.Чунку.
Верхний ордовик, бурский горизонт.

Palaeofavosites paulus Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/5, табл.II, фиг.3,4 (обр.315).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.44.
Сибирская платформа, р. Мойеро.
Нижний силур, лландовери.

Palaeofavosites sp.

Оригинал - ИГиГ, № 337/30, табл.VII, фиг.2а,б.
В.Н.Дубатов, 1969, с.28.

Северный Алтай, Ануйско-Чуйская котловина, кл. Ганин, в
0,5 км ниже пос. Киреевского.
Нижний силур.

Parallelaporella(?) bonus (Yanet)

Оригинал - ИГиГ, № 68I/28, табл.I, фиг.2а,б (экз. А 90-I).
Н.В.Миронова, 1974, с.42.

Горный Алтай, окрестности с.Камышенки, правобережье р.Камы-
шенки,

Нижний девон, ремневский горизонт.

Parallelaporella difformis (Shekhovich)

Оригиналы - ИГиГ, № 549/I4, табл.XVII, фиг.3а,б (экз. А 97-
28).

549/I5 (экз. А 97-10), не изображен.

Н.В.Миронова, 1978, с.IIO.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, левобережье р. Чер-
ный Ануй.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Parallelaporella favositiformis (Holtedahl)

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/25, табл.III, фиг.Iа,в (экз. I-II3 -
I8).

68I/26, табл.III, фиг.2а,б (экз. I-II3-I8а).

Окрестности с.Соловьихи, правый склон долины кл.Ганина, в
500 м ниже бывшего пос. Киреевского.

68I/27, табл.IV, фиг.Iа,б (экз. I-28-I).

Окрестности с.Соловьихи, левобережье кл.Ганина.

Н.В.Миронова, 1974, с.42.

Горный Алтай.

Верхний силур, приподольский ярус, черно-ануйский горизонт.

Parasarcinula spinosa Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/40, табл.XIII, фиг.3,4 (обр.9-5).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.74.

Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р. Н.Чунку, у руч. Кану.

Верхний ордовик, бурский горизонт.

Parasarcinula trabeculata Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/39, табл. XIII, фиг. I, 2 (обр. 9-2).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.73.

Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р. Н.Чунку, у руч. Кану.

Верхний силур, бурский горизонт.

Parastriatorpora dobretzovi Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 290/4, табл. III, фиг. 2а-г.

В.Н.Дубатов, Р.Е.Алексеева, 1967, с.24.

Пенжинский хребет, р. Веер, левый приток р. Большой Упупкин.

Средний девон, эйфельский ярус.

Parastriatorpora dogdensis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/128, табл. LII, фиг. 2б-г.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/127, табл. LII, фиг. 1б.

337/129, табл. LII, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатов, 1969, с.93-95.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита, нелюдимский горизонт.

Parastriatorpora grandis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/125, табл. LI, фиг. 1а-в.

Оригинал - ИГиГ, № 337/126, табл. LI, фиг. 2а-г.

В.Н.Дубатов, 1969, с.92-93.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датнинская свита, нелюдимский горизонт.

Parastriatopora grandissima Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/10, табл. IУ, фиг.4; табл.У, фиг.1а-д; табл.УІ, фиг.1а,б.

В.Н.Дубатов, Н.Я.Спасский, 1964, с.121.

Юго-западная окраина Кузнецкого бассейна; левый берег р.Большой Бачат, в районе дер. Мамонтово.

Нижний девон, крековские слои.

Parastriatopora innae Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/60, табл.XXIV, фиг. 2а-г.

Оригинал - ИГиГ, № 72/59, табл.XXIV, фиг.1а,б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.64-66.

Кузнецкий бассейн, правобережье р.Черневой Бачат, к юго-востоку от карьера 2-я сопка, в 0,4 км к ЮВ 120° от безымянного озера.

Верхний силур, тиверокий ярус, томь-чумышские слои.

Parastriatopora longispina Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689а/8, табл.с - 13, фиг. 2а,б (экз.2-17/7).

П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.66.

Южный склон Салаира, р.Чумыш, близ с. Сары-Чумыш.

Силур, отложения горы Глядень.

Parastriatopora marginata Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/134, табл.LIV, фиг.2а,б; табл. LV, фиг.1а,б.

Левобережье р.Уляган.

Оригинал - ИГиГ, № 337/135, табл. LV, фиг.2.

Бассейн р. Талалах, левобережье руч. Яр в 2,9 км к востоку-юго-востоку от высоты 403,3 м.

В.Н.Дубатов, 1969, с.98-99.

Хребет Уш-Уракчан.

Нижний девон, чоатангерская свита.

Parastriatopora obsoleta Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/136, табл. LV, фиг. 3а, б.
В.Н.Дубатовлов, 1969, с.99-100.
Хребет Уш-Уракчан, водораздел руч. Яр и Ледяного.
Нижний девон, чоатангасская свита.

Parastriatopora(?) *paradoxa* Chekhovich

Оригинал - ИГиГ, № 337/133, табл. LIII, фиг. 4а-г; табл. LIV, фиг. 1а-в.
В.Н.Дубатовлов, 1969, с.97-98.
Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхтах, бассейн р. Догдо, р. Хобочало, Коралловые ворота.
Нижний девон, датнинская свита, нелюдимский горизонт.

Parastriatopora rzonnickajae Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 6896/4, табл. Д-21, фиг. 1а-б (экз. 2242).
В.Н.Дубатовлов, Н.В.Миронова, 1960, с.358.
Салаир, бассейн р. Уксунай, близ устья р. Большой Речки.
Нижний девон, крековские слои.

Parastriatopora ex gr. *rzonnickajae* Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/35, табл. XII, фиг. 1а, б.
В.Н.Дубатовлов, 1969, с.35.
Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, левобережье р. Черневой Бачат, Гурьевский карьер.
Нижний девон, крековские слои.

Parastriatopora tchumyshensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689а/7, табл. S - 13, фиг. 1а-в (экз. 2 - 17/18).
П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.64.
Южный склон Салаира, р. Чумыш, близ с. Сары-Чумыш.
Силур, отложения горы Глядень.

Parastriatorpora tebenjkovi (Tchernyshev)

Топотип - ИГиГ, № 260/25, табл. IX, фиг. I, 2 (обр. 8I-2).

Р. Летняя.

Оригиналы - ИГиГ, № 260/26, табл. IX, фиг. 4-6 (обр. 200).

260/27, табл. IX, фиг. 3, 7 (обр. I75).

Р. Мойеро.

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.62.

Сибирская платформа.

Нижний силур, венлок.

Parastriatorpora undosa Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/28, табл. IX, фиг. 8, 9 (обр. I23-I).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.63.

Сибирская платформа, бассейн р. Северной, руч. Ланги в 30 км от устья.

Нижний силур, венлок.

Parastriatorpora uralica minima Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/I32, табл. LIII, фиг. 3а-в.

В.Н.Дубатов, 1969, с.96-97.

Северо-Восток СССР, хребет Сетте-Дабан, руч. Тихий.

Нижний девон, нижнесеттедабанский горизонт.

Parastriatorpora uralica uralica Chekhovich

Оригиналы - ИГиГ, № 337/I30, табл. LIII, фиг. Ia-г.

337/I3I, табл. LIII, фиг. 2.

В.Н.Дубатов, 1969, с.95-96.

Северо-Восток СССР, хребет Сетте-Дабан, руч. Тихий.

Нижний девон, нижнесеттедабанский горизонт.

Parastriatorpora sp.

Голотип - ИГиГ, № 337/36, табл. XII, фиг. 2.

В.Н.Дубатов, 1969, с.35.

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, среднее течение р. Томь-Чумыш.

Средний девон, эйфельский ярус.

Parastriatorpora sp.

Оригинал - ИГиГ, № 544/33, табл. XI, фиг. 3а-г.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с. 110.

Рудный Алтай, район г. Лениногорска, Крюковская сопка, отвалы бывшего Крюковского рудника.

Нижний девон, крюковская свита.

Paratetradium quadrilobatum Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/62, табл. XXI, фиг. 5 (обр. 42-I).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. 95.

Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р. Н.Чунку, правый берег, в 18 км выше устья р. Черлечина.

Верхний ордовик, долборский ярус.

Plasosoenites capillaris Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/62А, табл. XXVII, фиг. 5а, б.

Оригинал - ИГиГ, № 400/62, табл. XXVII, фиг. 4.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с. 109-110.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, правый берег р. Хобо - чало, в 1 км ниже устья руч. Щеточного,

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

Plasosoenites crassimus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 544/42, табл. XIV, фиг. 1а-в.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с. 114.

Рудный Алтай, район г. Лениногорска, Андреевский карьер, восточный борт, высотная отметка 880-900 м.

Средний девон, сокольная свита

Plasosoenites ex gr. *escharoides* (Steininger)

Оригинал - ИГиГ, № 681/142, табл. LXVI, фиг. 2а-в (экз. А-106 - 41).

Н.В.Миронова, 1974, с.163.

Горный Алтай, окрестности с. Барагаш, правобережье р. Куваш.
Нижний девон, кувашский горизонт.

Placosenites gradatus (Lecompte)

Оригинал - ИГиГ, № 72/108, табл. XXXVIII, фиг. 2а-г.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.104-105.

Кузнецкий бассейн, левый берег р. Кара-Чумыш в 0,5 км ниже пионерского лагеря, напротив дер. Кара-Чумыш.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Placosenites gradatus (Lecompte)

Оригинал - ИГиГ, № 400/63, табл. XXVII, фиг. 6а-в.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с.108.

Хребет Ул-Уракчан, левобережье р. Талалах, водораздел ручьев Идеал и Резерв, в 1,4 км к северо-западу от высоты 770,0 м.

Средний девон, эйфельский ярус, хемтычанская толща.

Placosenites medius (Lecompte)

Оригинал - ИГиГ, № 544/37, табл. XII, фиг. 5а,б.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с.112.

Рудный Алтай, правый берег р. Ульбн, в 1190 м ниже слияния рек Тихой и Громотухи.

Средний девон, лосищенская свита.

Placosenites orientalis (Eichwald)

Оригинал - ИГиГ, № 681/141, табл. LXVI, фиг. 1а-в (экз. А 247а-26).

Н.В.Миронова, 1974, с.102.

Горный Алтай, окрестности с. Барагаш, правобережье р. Куваш.
Нижний девон, кувашский горизонт.

Placosenites orientalis (Eichwald)

Оригиналы - ИГиГ, № 544/38, табл. XIII, фиг. I.

544/39, табл.XIII, фиг.2.

544/40, табл.XIII, фиг.3а,б.

544/41, табл.XIII, фиг.4а,б.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с.II3.

Рудный Алтай, правый берег р.Ульон, в 1190 м ниже слияния рек Тихой и Громотухи.

Средний девон, лосищенская свита.

Plasoscoenites rotundus Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/35, табл.XI, фиг.6,7 (обр. 90).

Б.С.Соколов, Д.И.Тесаков, 1965, с.68.

Сибирская платформа, р. Подкаменная Тунгуска, ниже р. Лебяжьей.

Нижний силур, венлок.

Plasoscoenites rukhini Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/67, табл.XXIX, фиг.Ia-д.

Оригинал - ИГиГ, № 400/68, табл.XXIX, фиг.2.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с.II0-III.

Хребет Тас-Хаяхта, левый берег руч. Щеточного, в 1,7 км выше устья.

Средний девон, живетский ярус, себечанский горизонт.

Plasoscoenites salairicus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/107, табл.XXXVIII, фиг.Ia-д.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.I02-I03.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, северный борт Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Plasoscoenites scaberimus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/109, табл.XXXVIII, фиг. 3г,д.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.I05-I07.

Кузнецкий бассейн, Тырган, холм с высотной отметкой 433,1 м.

Средний девон, живетский ярус, сафоновские слои.

Placocoenites tchergaensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 549/23, табл. XIX, фиг.5 (экз.А 85-38).

Н.В.Миронова, 1974, с.II5.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, левобережье р.Ануй.

Верхний силур, марагдинская свита.

Placocoenites sp.

Оригинал - ИГиГ, № 337/46А, табл.XIX, фиг.5.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.4I.

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, район г.Гурьевска, левобережье рч. Салаирки.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Pleurodictyum crassispinosum Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/I5, табл.XI, фиг.1а-в.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с.67-68.

Горный Алтай, Ануйско-Чуйская котловина, кл.Ганин.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Plicatomurus aytashkinae Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/5, табл.XIV, фиг.1а,б; табл.XV, фиг.2 (экз. А 502-44).

Н.В.Миронова, 1974, с.28.

Горный Алтай, окрестности с.Сибириячихи, правый берег р.Ануй, в I км выше устья р.Сибирики.

Нижний девон, жединский ярус, ремневский горизонт.

Plicatomurus stepanovi Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/4, табл.XVI, фиг.1а,б (экз. С 584-I).

Н.В.Миронова, 1974, с.27.

Горный Алтай, окрестности с.Сибириячихи, правый берег р.Ануй, против устья р.Сибирики.

Нижний девон, жединский ярус, ремневский горизонт.

Plicatomurus unicus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/24, табл. XI, фиг. 1а, б.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 29.

Кузнецкий бассейн, правобережье р. Большой Бачат, в 400 м к югу от средней части дер. Заречной.

Средний девон, живетский ярус, сафоновские слои.

Propora chekhoviche Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/14, табл. XXXIII, фиг. 2а, б (экз. У-3-6/85I).

Н.В.Миринова, 1965, с. 136.

Восточный склон Салаира, в районе дер. Бачаты, У разведочная линия, канава № 3.

Верхний силур, лудлов, баскуская свита.

Propora salairica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/15, табл. XXXIV, фиг. 2а, б (У-3-20/85I).

Н.В.Миринова, 1965, с. 137.

Восточный склон Салаира, район дер. Бачаты, У разведочная линия, канава № 3.

Верхний силур, лудлов, баскуская свита.

Rhabdotetradium floriforme Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/65, табл. XXII, фиг. 3, 4 (обр. I85-I).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. 98.

Сибирская платформа, р. Чуя, в 4,5 км ниже устья р. Амутканя.

Верхний ордовик, низы долборокого яруса.

Rhabdotetradium nobile Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/63, табл. XXI, фиг. 6, 7 (обр. I57-5).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с. 97.

Сибирская платформа, р. Чуя, в 7,5 км выше устья р. Арба - кунчу.

Верхний ордовик, долборокий ярус.

Riphaeolites(?) gracianovae Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/7, табл.III, фиг.2а-д.

В.Н.Дубатов, Н.Я.Спаский, 1964, с.120.

Горный Алтай, район с.Куры.

Средний девон, низы айфельского яруса.

Roeberipora altaica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/I48, табл.LV, фиг.1а,б (экз.А-10I-4).

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/I49, табл.LV, фиг.2а,б (экз. А - 10I-18).

68I/I50, табл.LVI, фиг.1а,б (экз. А-10I-1).

Н.В.Миронова, 1974, с.109.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьи, левый склон лога Хомичева в 1 км от устья.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Roeberipora bogemica (Barrand)

Оригинал - ИГиГ, № 72/57, табл.XXIII, фиг.1а-д.

В.Н.Дубатов, 1963, с.60-62.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, канава около восточного края Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Roeberipora(?) gamosa Mironova

Голотип - ИГиГ, № 549/I7, табл.XIX, фиг.1а-в (экз. А-90-1).

Н.В.Миронова, 1978, с.112.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, левобережье р.Черги.

Верхний силур, черноануйская свита.

Roeberipora zalairica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/I52, табл.LXVII, фиг.2а,б (экз.12а-24).

Оригинал - ИГиГ, № 68I/I51, табл.LXVII, фиг.1 (экз.10б-28).

Н.В.Миронова, 1974, с.109.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, левобережье р.Малый Бачат,
Гурьевский холм.

Нижний девон, салаиркинский горизонт.

Roemeripora sp.

Оригинал - ИГиГ, № 544/9, табл.IV, фиг.3.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с.98.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, правый берег р.Ульбы, в
30 м ниже слияния рек Тихой и Громотухи.

Средний девон, лосищенская свита.

Roemerolites batschatensis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/54, табл.XXII, фиг.1а-г.

Оригинал - ИГиГ, № 72/55, табл.XII, фиг.2а-в.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.59-60.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, в районе г.
Гурьевска, совхоз ГМЗ, в 250 м к СВ Ю⁰ от бывшей Крековской
мельницы.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Rossopora sp.

Оригинал - ИГиГ, № 337/164, табл. LXVII, фиг.2.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.142.

Хребет Тас-Хаяхта, правый берег р.Хобочало, Коралловые воро-
та.

Нижний девон, датминская свита.

Scoliopora conferta omolonica Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/71, табл.XXX, фиг.1б-д.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с.114-115.

Хребет Уш-Уракчан, левый приток р.Талалах, около устья руч.
Ледяного.

Средний девон, живетский ярус, леденинские слои.

Scoliopora denticulata (M.-Edw. et Haime)

Оригинал - ИГиГ, № 400/70, табл. XXIX, фиг. 4а-д.

В.Н.Дубатов, 1972, с. II2-II3.

Хребет Тас-Хаяхта, правобережье р.Догдо, верховье руч. Водопадного.

Средний девон, живетский ярус, себечанский горизонт.

Scoliopora (?) *minutissima* Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/74, табл. XXX, фиг. 4а-г.

Оригиналы - ИГиГ, № 400/72, табл. XXX, фиг. 2а, б.

400/73, табл. XXX, фиг. 3.

В.Н.Дубатов, 1972, с. II3-II4.

Хребет Тас-Хаяхта, правобережье р.Догдо, левый берег р.Себечан, напротив устья безымянного ручья, впадающего справа, в 6,5 км выше устья.

Средний девон, живетский ярус, себечанский горизонт.

Scoliopora pulchra Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 259/9, табл. XXX, фиг. 5а-в.

В.Н.Дубатов, 1972, с. II5.

Кузнецкий бассейн, западная окраина, левый берег р. Большие Изны, в 100 м ниже Вассинской ГЭС.

Верхний девон, Франский ярус, шубкинский горизонт.

Scoliopora sp.

Оригинал - ИГиГ, № 72/II4, табл. XXXIX, фиг. 3б, в.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 108.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, западная стена Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Sibiriolites elegans Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/72, табл. XXV, фиг. I, 2 (обр. 385).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.106.
Сибирская платформа, р. Мойеро.
Верхний ордовик, долборский ярус.

Sibiriolites reticulatus Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/71, табл. XXIV, фиг. 5, 6 (обр. 44-2).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.105.
Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р.Н.Чунку.
Верхний ордовик, долборский ярус.

Sibiriolites sibiricus Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/73, табл. XXV, фиг. 3, 4 (обр. 106/3).
Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.107.
Сибирская платформа, бассейн р. Чуни, р.Н.Чунку.
Средний ордовик, мангазейский ярус.

Schedohalisites latus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/12, табл. XXXII, фиг. 1а, б (экз. 2235 - 20/851).
Н.В.Миронова, 1965, с.135.
Восточный склон Салаира, правый берег р. Уксунай, в 1,5 км выше д. Жениховки.
Верхний силур, баскуская свита.

Squameoalveolites(?) incrustans Kokscharskaja

Оригинал - ИГиГ, № 681/115, табл. L, фиг. 1а, б (экз. Т-74-18).
Н.В.Миронова, 1974, с.87.
Горный Алтай, окрестности с. Соловьи, лог Хомичев.
Нижний девон, киреевский горизонт.

Squameofavosites ambiguus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 6896/2, табл. S - 19, фиг. 1а, б (экз. 339-19).
В.Н.Дубатов, Н.В.Миронова, 1960, с.325.
Центральный Салаир, Верхнебердский бассейн, близ пос. Октябрьского.

Нижний девон, мочегинские слои.

Squameofavosites bohemicus (Pösta)

Оригинал - ИГиГ, № 682/3, табл. I, фиг. Ia, б (экз. 275/3).

Н.В.Миронова, 1961, с.150.

Салаир, район г.Гурьевска, юго-восточнее 2-й сопки.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Squameofavosites bohemicus (Pösta)

Оригиналы - ИГиГ, № 72/40, табл. XVII, фиг. Ia-e.

72/41, табл. XVII, фиг. 2a, б.

Кузнецкий бассейн, правобережье р.Черновой Бачат, юго-восточнее карьера Вторая сопка, в 0,4 км юго-восточнее безымянного озера.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

72/42, табл. XVII, фиг. 3a, б.

Чехословакия, Баррандиен, район с.Конепрусы, южный склон горы Златый Кунь.

Пражский ярус, верхние конепрусские известняки.

В.Н.Дубатов, 1963, с.45-47.

Squameofavosites bohemicus forma taimyrica Mironova

Голотип - № 681/46, табл. II, фиг. Ia-в (экз. 24-5958).

Сов.Арктика, п-ов Таймыр, р.Тарей.Тарейская свита.

Оригинал - ИГиГ, № 681/45, табл. I, фиг. Ia, б (экз. А 90-149).

Горный Алтай, окрестности с.Камышенки, левобережье р.Камышенки.

Ремневский горизонт.

Н.В.Миронова, 1974, с.51.

Нижний девон.

Squameofavosites brusnitzini (Peetz)

Оригинал - ИГиГ, № 681/47 табл. LXXIX, фиг. Ia, б (экз. 40-22).

Н.В.Миронова, 1974, с.56.

Салаир, левый берег р.Малый Бачат, у бывшей крековской мельницы.

Нижний девон, верхнекрековские слои.

Squameofavosites cribratus gracilisquamatus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/120, табл. XLVIII, фиг. 2а-д.

В.Н.Дубатов, 1969, с.86-87.

Хребет Сетте-Дабан, руч. Тихий.

Нижний девон, верхнесеттедабанский горизонт.

Squameofavosites dictyofavositoides Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/37, табл. XV, фиг. 5а-в.

Оригинал - ИГиГ, № 72/38, табл. XV, фиг. 6.

В.Н.Дубатов, 1963, с.44-45.

Кузнецкий бассейн, левый берег р.Томь-Чумыш, в районе с.Томского, в 700 м ниже лесопилки.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

Squameofavosites divissimus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/43, табл. XVIII, фиг. 1а-д.

В.Н.Дубатов, 1963, с.49-50.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, в совхозе ИМЗ, в 250 м к северо-востоку от бывшей Крековской мельницы.

Средний девон, эйфельский ярус; салаиркинские слои.

Squameofavosites dubatolovi Mironova

Голотип - ИГиГ, № 682/II, табл. IV, фиг. 3а,б (экз. I3-2I).

Н.В.Миронова, 1961, с.153.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, Толсточицкий карьер.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Squameofavosites finitimus (Yanet)

Оригинал - ИГиГ, № 690/20, табл. II, фиг. 4а,б (экз. К 3675-I).

В.И.Краснов, Н.В.Миронова, В.Ф.Асташкина, 1978, с.96.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, Толсточицкий карьер.

Верхний силур, сухая свита.

Squameofavosites frequens Smirnova

Оригиналы - ИГиГ, № 72/46, табл. XIX, фиг. 2в, г.

Левобережье р. Салаирки, холм, расположенный в конце улицы Набережной г. Гурьевска.

72/47, табл. XIX, фиг. 3а, б.

Левобережье р. Черновой Бачат, северная стена Гурьевского карьера.

В. Н. Дубатов, 1963, с. 47-49.

Кузнецкий бассейн.

Нижний девон, крековские слои.

Squameofavosites fungites (Sokolov)

Оригинал - ИГиГ, № 689а/6.

П. С. Дзюб, Н. В. Миронова, 1960, с. 65.

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Толсточи́хинский карьер.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Squameofavosites fungites (Sokolov)

Оригинал - ИГиГ, № 682/4, табл. I, фиг. 2а-в (экз. I3-7).

Н. В. Миронова, 1961, с. 151.

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Толсточи́хинский карьер.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Squameofavosites fungitiformis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/29, табл. XIII, фиг. Iв-е.

Оригиналы - ИГиГ, № 72/30, табл. XIII, фиг. 2б.

72/31, табл. XIV, фиг. Iб-г.

В. Н. Дубатов, 1963, с. 34-36.

Кузнецкий бассейн, правобережье р. Черновой Бачат, Толсточи́хинский карьер, восточно-юго-восточная стена.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

Squameofavosites gurvevskiensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 682/9, табл. III, фиг. 2; табл. IV, фиг. I (экз. I3-9).

Н.В.Миронова, 1961, с.152.

Салаир, район г.Гурьевска, Толсточи́нский карьер.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Squameofavosites gurjevskiensis Mironova

Оригиналы - ИГиГ, № 72/38-I, табл.ХVI, фиг.1.

72/39а, табл.ХVI, фиг.2б,г.

В.Н.Дубатов, 1963, с.40-42.

Кузнецкий бассейн, правобережье р.Черновой Бачат, восточно-юго-восточная стена Толсточи́нского карьера.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

Squameofavosites insolitus Mironova

Голотип - ИГиГ, № 682/8, табл.II, фиг.2а-в (экз. 275б).

Н.В.Миронова, 1961, с.151.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, юго-восточнее карьера 2-й сопки.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Squameofavosites intricatus (Barrand)

Оригинал - ИГиГ, № 72/46Б, табл.XIX, фиг.4а,б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.48.

Чехословакия, Баррандиен.

Нижний девон, пражский ярус, верхние конепрусские известняки.

Squameofavosites narcevae (Dubatolov)

Оригинал - ИГиГ, № 681/48, табл.LXXIX, фиг.3а,б (экз.15-27).

Н.В.Миронова, 1974, с.56.

Салаир, г.Гурьевск, левый берег р.Малый Бачат, близ бывшей крековской мельницы.

Нижний девон, верхнекрековские слои.

Squameofavosites kulкови Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/44, табл.XVIII, фиг.2а-д.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.50-52.

Кузнецкий бассейн, правый борт долины р.Большой Бачат, в устье первого лога, что выше р. Баскуская.
Средний девон, эйфельский ярус, нижняя часть шандинских слоев.

Squameofavosites nikiforovae (Dubatolov)

Оригинал - ИГиГ, № 68I/43, табл.LXXIII, фиг.Ia,б (экз. I9-I8).

Н.В.Миронова, 1974, с.54.

Салаир, окрестности с.Томского, левый берег р.Томь-Чумыш.
Нижний девон, томь-чумышский горизонт.

Squameofavosites peetzi (Tchernychev)

Оригинал - ИГиГ, № 68I/4I, табл.LXX, фиг.Ia,б (экз.9-I).

Н.В.Миронова, 1974, с.52.

Центральный Салаир, Верхнебердский бассейн, правый берег р. Павловки, у д.Калачики.

Нижний девон, мочегинская свита.

Squameofavosites proprius Mironova

Голотип - ИГиГ, № 690/2I, табл.II, фиг.5a,б (экз.I30-I9).

В.И.Красное, Н.В.Миронова, В.Ф.Астапкина, 1978, с.96.

Салаир, р.Уксунай, в 200 м выше устья р.Большой Речки.
Нижний силур-верхний ордовек.

Squameofavosites pseudofungites Barskaja

Оригинал - ИГиГ, № 337/II9, табл.XLVIII, фиг.Ia-г.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.83-85.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, датчинская свита.

Squameofavosites singularis (Sokolov)

Оригинал - ИГиГ, № 72/33, табл.XIV, фиг.3.

В.Н.Дубатов, 1963, с.37-38.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, канава, расположенная у восточного края Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Squameofavosites socialisiformis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/123, табл. I, фиг. Ia-e.

В.Н.Дубатов, 1969, с.87-88.

Среднее течение р.Колымы, правый берег, в 15 км ниже устья рч. Шаманихи.

Нижний девон, датнинская свита.

Squameofavosites sokolovi Chekhovich

Оригиналы - ИГиГ, № 72/35, табл. XV, фиг. 2.

Левый берег р.Керлегеш, в 950 м выше устья.

72/36, табл. XV, фиг. 3.

Левобережье р.Черновой Бачат, западная стена Гурьевского карьера.

72/37-I, табл. XV, фиг. 4.

Канава у северного края Гурьевского карьера.

В.Н.Дубатов, 1963, с.38-40.

Кузнецкий бассейн.

Нижний девон, крековские слои.

Squameofavosites spongiosus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/34, табл. XV, фиг. Ia-d.

В.Н.Дубатов, 1963, с.42-44.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Кара-Чумын, примерно в 700 м ниже дер. Першино.

Нижний девон, нижняя часть крековских слоев.

Squameofavosites thetidis Chekhovich

Оригинал - ИГиГ, № 72/32, табл. XIV, фиг. 2a-г.

В.Н.Дубатов, 1963, с.36-37.

Кузнецкий бассейн, правобережье р.Черновой Бачат, Толсточижи-

ский карьер, восточно-юго-восточная стена.
Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

Squameofavosites tomensis Mironova

Голстип - ИГиГ, № 682/5, табл. I, фиг. 4а, б (экз. 2444).
Окрестности с. Томского, кл. Амфиоровый.
Оригинал - ИГиГ, № 682/6, табл. I, фиг. 5а, б (экз. 736).
Окрестности дер. Алексеевки.
Н.В. Мironova, 1961, с. 151.
Салаир, бассейн р. Уксунай.
Нижний девон, томь-чумышские слои.

Squameofavosites tomensis Mironova

Оригинал - ИГиГ, № 681/44, табл. LXXI, фиг. 1а, б (экз. 297-I).
Н.В. Мironova, 1974, с. 55.
Салаир, окрестности с. Томского, левый берег р. Томь-Чумыш.
Нижний девон, томь-чумышский горизонт.

Squameofavosites(?) uralensis Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 681/42, табл. LXXI, фиг. 1а, б (экз. 275 к (2)).
Н.В. Мironova, 1974, с. 53.
Салаир, окрестности г. Гурьевска, близ карьера 2-й сопки.
Нижний девон, томь-чумышский горизонт.

Squameofavosites sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/122, табл. XLIX, фиг. 2а, б.
Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало,
Коралловые ворота.
Нелюдемский горизонт.
337/121, табл. XLIX, фиг. 1а-д.
Хребет Сетте-Дабан, руч. Тихий.
Нижнесеттедабанский горизонт.
В.Н. Дубатов, 1964, с. 85-86.
Нижний девон.

Squameofavosites (Dictyofavosites) concentricus (Rukhin)

Неотип - ИГиГ, № 337/105, табл. XLIV, фиг. 2а-г.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.89-90.

Среднее течение р.Колымы, правый берег, в 15 км ниже устья р. Паманихи.

Нижний девон, нелюдинский горизонт.

Squameofavosites (Dictyofavosites) salairicus Tchernyshev

Оригиналы - ИГиГ, № 337/106, табл. XLV, фиг. I.

337/107, табл. XLV, фиг. 2а, б.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.90-91.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, нелюдинский горизонт.

Squameofavosites (Dictyofavosites) sp.

Оригинал - ИГиГ, № 337/60, табл. XXV, фиг. 4.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.142.

Кузнецкий бассейн, р.Томь-Чумыш в районе с.Томского.

Нижний девон, томь-Чумышские слои.

Spiroclados avrovi Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 359/20, табл. IY, фиг. 1а-в, 2б; табл. Y, фиг. 1а, б.

Оригиналы - ИГиГ, № 359/21, табл. IY, фиг. 2а; табл. Y, фиг. 2.

359/22, табл. IY, фиг. 2в.

359/23, табл. Y, фиг. 3.

Д.П.Авров, В.Н.Дубатовлов, 1969, с.26-28.

Южный Алтай, хребет Листвяга, правый берег р.Белой, 450 м выше устья рч. Околееха.

Нижний девон, сарымсактинская свита.

Stelliporella arapeosa Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 261/13, табл. XXIX, фиг. 3 (обр. II8а).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.136.

Бассейн р.Колымы, р. Тирехтях.

Верхний ордовик, лландовери.

Stelliporella chaetetoides Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 261/14, табл.ХХІХ, фиг.4,5 (обр.118а/1).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.137.

Бассейн р.Колымы, р. Тирехтях.

Верхний ордовик, лландовери.

Stelliporella karlunae Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/22, табл.ІХ, фиг.4а,б.

Оригинал - ИГиГ, № 248/23, табл.ІХ, фиг.5.

В.Н.Дубатов, Н.А.Спасский, 1964, с.131.

Северное Прибалхашье, Баян-Аульский район,

Средний девон, эйфельский ярус.

Striatopora anuensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 685/9, табл.ХХХІ, фиг.І (экз.Д-139-4/852).

Н.В.Миронова, 1965, с.133.

Горный Алтай, левый склон р.Ануй, против с.Черный Ануй.

Верхний силур, лудлов, чагырская свита.

Striatopora crebra Mironova

Голотип - ИГиГ, № 682/13, табл.У, фиг.3а-в (экз.130-9).

Н.В.Миронова, 1961, с.155.

Салаир, правый берег р.Уксунай, в 150 м выше устья Большой Речки.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Striatopora crebra Mironova

Оригинал - ИГиГ, № 681/8, табл. LXXXI, фиг.2а,б (экз.130-9).

Н.В.Миронова, 1974, с.30.

Салаир, правый берег р.Уксунай, в 150 м выше устья р.Большой Речки.

Нижний девон, томь-чумышский горизонт.

Striatopora illustra Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/69, табл. XXVI, фиг. 46-г.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 72-73.

Кузнецкий бассейн, правобережье р.Черневой Бачат, Толсточи-
хинский карьер, восточно-юго-восточная стена.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

Striatopora illustra Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 68I/10, табл. XII, фиг. 6а, б (экз. Г-33-
153).

Н.В.Миронова, 1974, с. 31.

Горный Алтай, окрестности с. Камышенки, левобережье р. Камы -
шенки.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Striatopora jejuna Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/70, табл. XXVII, фиг. 1а-ж.

Оригинал - ИГиГ, № 72/71, табл. XXVII, фиг. 2.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 73-75.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черневой Бачат, в районе г.
Гурьевска, в 250 м к СВ 10⁰ от бывшей крековской мельницы.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

Striatopora khalfini (Dubatolov)

Оригинал - ИГиГ, № 68I/7, табл. XVII, фиг. 1а, б (экз. С 556-I).

Н.В.Миронова, 1974, с. 29.

Горный Алтай, окрестности с. Сибирячихи, правобережье р. Ануй,
в 1 км выше устья р. Сибирки.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Striatopora kimi Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/13, табл. XXXIX, фиг. 2а (экз. 3I-7).

Н.В.Миронова, 1974, с.33.

Горный Алтай, окрестности с.Камышенки, левобережье р.Камы –
шенки, к юго-западу от горы Колпак, канава у триангуляцион-
ной вышки.

Нижний девон, ремневский(?) горизонт.

Striatopora longa Koksharskaja

Оригинал – ИГиГ, № 337/147, табл. LXI, фиг.1а-в.

В.Н.Дубатов, 1969, с.105-106.

Хребет Сетте-Дабан, руч. Тихий.

Нижний девон, верхнесеттедабанский горизонт.

Striatopora minuscula Tschudinova

Оригинал – ИГиГ, № 681/9, табл. XIII, фиг. 4а-в (экз. КЛ 2-II).

Н.В.Миронова, 1974, с.30.

Горный Алтай, окрестности с.Камышенки.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Striatopora minuscula Tschudinova

Оригинал – ИГиГ, № 690/6, табл. II, фиг. 3 (экз. К 3675-4а).

В.И.Краснов, Н.В.Миронова, В.Ф.Асташкина, 1978, с.92.

Салаир, правый берег р.Уксунай, в 200 м выше устья р.Большой
Речки.

Верхний силур, сухая свита.

Striatopora ornata Mironova

Голотип – ИГиГ, № 681/12, табл. XLI, фиг. 2а, б (экз. Т 74/5I).

Н.В.Миронова, 1974, с.32.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, правый склон лога Хо-
мичева, в его верхней части.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Striatopora peetzi Dubatolov

Оригиналы – ИГиГ, № 72/63, табл. XXV, фиг. 3.

Средняя часть канавы, расположенной на южном склоне холма, находящегося в 100 м от западного края ул.Фурманова в совхозе ГМЗ.

Средний девон, эйфельский ярус, салаиркинские слои.

72/64, табл.XXV, фиг.4а,б.

Старогурьевский карьер у железнодорожного моста через р.Салаирку.

Нижний девон, малобачатские слои.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат.

В.Н.Дубатов, 1963, с.73.

Striatopora peetzi Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 544/16, табл.VII, фиг.I.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.100.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, Кроковская сопка, отвалы бывшего Кроковского рудника.

Нижний девон, кроковская свита.

Striatopora peetzi settedabanica Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/145, табл.LX, фиг.1а-г.

Оригинал - ИГиГ, № 337/146, табл.LX, фиг.2а-в.

В.Н.Дубатов, 1969, с.106-108.

Хребет Сетте-Дабан, руч.Тихий.

Нижний девон, верхнесеттедабанский горизонт.

Striatopora salairica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 682/16, табл.V, фиг.4а,б (экз.130-37).

Н.В.Миронова, 1961, с.156.

Салаир, р.Уксунай, в 150 м выше устья р.Большой Речки.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Striatopora subrotunda Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 290/8, табл.III, фиг.5.

В.Н.Дубатов, Р.Е.Алексеева, 1967, с.25-26.

Пенкинский хребет, руч. Веер, левый приток р.Большой Упупкин.

Средний девон, эйфельский ярус.

Striatopora tenuimuralis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/II, табл.ХІ, фиг.5а,б (экз.Т-ІО).
Н.В.Миронова, 1974, с.3І.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, правый склон долины
кл. Гаяина, в 200 м выше бывшего пос. Киреевского.
Нижний девон, киреевский горизонт.

Striatopora tschichatschewi Peetz

Оригинал - ИГиГ, № 6896/5, табл.Д - 22, фиг.2а,б (экз. 6І-7).
В.Н.Дубатов, Н.В.Миронова, 1960, с.359.
Юго-западное Присалаирье, район с.Чупино.
Нижний девон, крековские слои.

Striatopora tschichatschewi Peetz

Оригиналы - ИГиГ, № 359/5, табл.ІІ, фиг.2.
359/6, табл.ІІ, фиг.3а,б.

Д.П.Авров, В.Н.Дубатов, 1969, с.19-20.

Южный Алтай, хребет Сарымсакты, правобережье р.Сарымсакты,
левый берег, 1,2-1,5 км к северо-западу от устья рч. Салаир-
ки.

Нижний девон, сарымсактинская свита.

Striatopora tschichatschewi Peetz

Оригинал - ИГиГ, № 68I/6, табл.ХХХІХ, фиг.3а,б (экз.37а-2).
Н.В.Миронова, 1974, с.29.

Горный Алтай, окрестности с.Камышенки, левобережье рч. Камы-
шенки.

Нижний девон, ганинская свита.

Striatopora tschichatschewi Peetz

Оригиналы - ИГиГ, № 544/І7, табл.УІІ, фиг.2.
544/І8, табл.УІІ, фиг.3.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.101.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, южный склон сопки, распо-

ложенный в I км к северу от Четвертого района Ульбастроа.
Нижний девон, тишинская свита.

Striatopora tschichatschewi tschichatschewi Peetz

Оригиналы — ИГиГ, № 337/142, табл. LVIII, фиг. Iв, г.

337/143, табл. LVIII, фиг. 2а-д.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 103-104.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, верховье р.Хобочало.

Нижний девон, нелюдимский горизонт, датнинская свита.

Striatopora tschichatschewi yacutica Dubatolov

Голотип — ИГиГ, № 337/144, табл. LIX, фиг. 2в-з.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 104-105.

Хребет Тас-Хаяхта, р.Догдо, правый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, нелюдимский горизонт, датнинская свита.

Striatopora zeaporoides Dubatolov

Голотип — ИГиГ, № 72/73, табл. XXVIII, фиг. I.

Оригиналы — ИГиГ, № 72/74, табл. XXVIII, фиг. 2.

72/75, табл. XXVIII, фиг. 3.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с. 75-76.

Кузнецкий бассейн, правобережье р.Черновой Бачат в 0,7 км к северо-востоку от северо-восточного края Акарачкинского карьера.

Средний девон, эйфельский ярус, мамонтовские слои.

Striatopora sp.

Оригинал — ИГиГ, № 68I/14, табл. XXXIX, фиг. Iа, б (экз. К 486-13).

Н.В.Миронова, 1974, с. 158.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьиных, лог Хомичев.

Нижний девон, ганинская свита.

Striatopora sp.

Оригинал - ИГиГ, № 544/19, табл. VII, фиг. 5.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с. 102.

Рудный Алтай, район г. Лениногорска, южный борт Андреевского карьера, на уступе с высотной отметкой 880-900 м.

Средний девон, сокольская свита.

Striatoporella gratica Rukhin

Неотип - ИГиГ, № 337/II3, табл. XLVII, фиг. 1а, б.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/II4, табл. XLVII, фиг. 2а, б.

337/II5, табл. XLVII, фиг. 3.

337/II6, табл. XLVII, фиг. 4а, б.

337/II7, табл. XLVII, фиг. 5а, б.

В.Н.Дубатов, 1969, с. 82-83.

Среднее течение р. Колымы, правый берег, в 15 км ниже устья р. Шаманихи.

Нижний девон, нелюдовский горизонт.

Striatoporella dogdensis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/31, табл. IX, фиг. 2а, б.

В.Н.Дубатов, 1972, с. 61.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, средняя часть ручья, впадающего справа в руч. Щеточный, в 2,8 км выше устья последнего.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинская свита.

Striatoporella multiporifera Rukhin

Неотип - ИГиГ, № 337/109, табл. XLVI, фиг. 1а-в.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/110, табл. XLVI, фиг. 2.

337/111, табл. XLVI, фиг. 3.

337/118, табл. XLVII, фиг. 6.

В.Н.Дубатов, 1969, с. 80-81.

Среднее течение р. Колымы, правый берег, в 15 км ниже устья р. Шаманихи.

Нижний девон, нелюдовский горизонт.

Striatoporella nativa Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/38, табл. XIII, фиг. Ia, б (экз. Г 33-189).

Горный Алтай, окрестности с. Камышенки, левобережье р. Камышенки.

Ремневский горизонт.

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/39, табл. LXXX, фиг. Ia, б (экз. 676).

68I/40, табл. LXXX, фиг. 2a, б (эвз. 2242-6).

Салаир, бассейн р. Укоунай, р. Большая Речка.

Томь-чумышский горизонт.

Нижний девон,

Н. В. Миронова, 1974, с. 50.

Subalveolitella repentina Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 260/34, табл. XI, фиг. 4, 5 (обр. 273).

Б. С. Соколов, Ю. И. Тесаков, 1963, с. 67.

Сибирская платформа, р. Мойеро.

Нижний силур, лландовери.

Subalveolites spinotuberculatus Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/31, табл. X, фиг. 5, 6 (обр. 74-3).

Б. С. Соколов, Ю. И. Тесаков, 1963, с. 65.

Сибирская платформа, р. Летняя, в 5 км от устья.

Нижний силур, венлок.

Subalveolites subulosus Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/32, табл. XI, фиг. I, 2 (обр. I24-I).

Бассейн р. Северной, руч. Ланги, в 0,5 км от устья.

Оригинал - ИГиГ, № 260/33, табл. XI, фиг. 3 (обр. I5-5).

Р. Летняя, в 0,3 км ниже устья р. Кей-Сась.

Б. С. Соколов, Ю. И. Тесаков, 1963, с. 66.

Сибирская платформа.

Нижний силур, венлок.

Subalveolites volutus Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/29, табл.Х, фиг.1,2 (обр. 224-4).

Р. Горбоячин, в 0,3 км ниже руч. Оленьего.

Паратип - ИГиГ, № 260/30, табл.Х, фиг.3,4 (обр.281/2).

Правый приток р.Омнутах, в 0,5 км от истока.

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.64.

Сибирская платформа.

Чижий силур, лландовери.

Subfavosites admirabilis (Dubatolov)

Оригинал - ИГиГ, № 681/24, табл.LVIII, фиг.3а,б (экз.А III-20).

Н.В.Миронова, 1974, с.41.

Горный Алтай, окрестности с.Барагаш, правобережье р.Куваш.

Нижний девон, кувашский горизонт.

Subfavosites(?) gregalis (Porfiriev)

Оригиналы - ИГиГ, № 681/18, табл.XXIV, фиг.2а,б (экз. А-509-21).

Горный Алтай, окрестности с.Сибириячки, правый берег р.Ануй, в 2 км выше устья р.Сибирики. Киреевский горизонт.

681/19, табл.XXV, фиг.1а,б (экз. К 48-42).

681/20, табл.XXV, фиг.2а,б (экз. Т 74-65).

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, лог Хомичев.

Киреевский горизонт.

681/21, табл. LX, фиг.1а,б (экз.12-12).

681/22, табл. LX, фиг.2а,б (экз.106-31).

681/23, табл. LX, фиг.3а,б (экз.106-28).

Салаир, окрестности г.Гурьевска, Гурьевский холм.

Салаирский горизонт.

Н.В.Миронова, 1974, с.39.

Нижний девон.

Subfavosites karpinskyi (Yanet)

Оригинал - ИГиГ, № 681/17, табл.XX, фиг.2а,б (экз.Т 10-1).

Н.В.Миронова, 1974, с.39.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьи, правый склон долины кл. Ганина, в 100 м выше бывшего пос. Киреевского. Нижний девон, киреевский горизонт.

Subfavosites klaamanni Mironova

Голотип - ИГиГ, № 681/15, рис. 4 (экз. 62).

Н.В.Миронова, 1974, с.37.

Подолля, левый берег р.Днестр, в 2 км ниже с.Сокол. Верхний силур, лудловский ярус, малиновецкий горизонт.

Subfavosites praecedens Swarz

Оригинал - ИГиГ, № 549/II, табл. XVII, фиг.1а-в (экз. А 97-17).

Н.В.Миронова, 1978, с.109.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, левобережье р.Черги. Верхний силур, черноануйская свита.

Subfavosites regularissimus var. minor (Yanet)

Оригинал - ИГиГ, № 681/16, табл. LVII, фиг.1а,б (экз. А-106-II4).

Н.В.Миронова, 1974, с.38.

Горный Алтай, окрестности с.Бараган, правобережье р.Куваш. Нижний девон, кувацкий горизонт.

Subfavosites uxunaiensis Mironova

Голотип - ИГиГ, № 690/7, табл. II, фиг.1а,б (экз. I30-58).

Правый берег р.Уксунай, в 200 м выше устья р.Большой Речки. Нижний девон, томь-чумышские слои.

Оригинал - ИГиГ, № 690/19, табл. II, фиг.2а,б (экз. К 3675-13).

Окрестности г.Гурьевска, Толсточицкий карьер.

В.И.Краснов, Н.В.Миронова, В.Ф.Асташкина, 1978 с.92.

Салаир.

Верхний силур, сухая свита.

Syringolites(?) indistinctus Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/52, табл.ХХІ, фиг.2а-в.

В.Н.Дубатов, 1963, с.57-58.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, северная стена Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Syringopora crispa Schlüter

Оригинал - ИГиГ, № 337/52, табл.III, фиг.2а-в.

В.Н.Дубатов, 1972, с.44.

Хребет Тас-Хаяхта, правобережье р.Хобочало, средняя часть руч. Щеточного, в 2,8 км выше устья.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

Syringopora fascicularis (Linne)

Оригинал - ИГиГ, № 681/155, табл.ХVIII, фиг.1а-г (экз.ДК-13).

Н.В.Миронова, 1974, с.155.

Горный Алтай, у с.Соловьи.

Нижний девон, сибирский(?) горизонт.

Syringopora paucis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 72/121, табл. ХLI, фиг.3а-в.

Оригинал - ИГиГ, № 72/120, табл. ХLI, фиг.2.

В.Н.Дубатов, 1963, с.109-III.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Черновой Бачат, юго-восточная стена Гурьевского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Syringopora schmidtii Tchernyshev

Оригинал - ИГиГ, № 359/24, табл.У, фиг.4а-в.

Д.П.Авров, В.Н.Дубатов, 1969, с.24-25.

Южный Алтай, хребет Листвяга, правый берег р.Белой, 370 м выше устья рч. Околеехи.

Нижний девон, сарымсактинская свита.

Syringopora schulzei Hörn sensu Penecke

Оригинал - ИГиГ, № 68I/I54, табл. LXVIII, фиг. Ia, б (экз. 273).

Н.В.Миронова, 1974, с.163.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, Гурьевский холм.

Нижний девон, салаиркинский горизонт.

Syringopora supragigantea Sokolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/5I, табл.III, фиг.3а-б.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с.46.

Хребет Тао-Хаяхта, верховье р.Халим.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинский горизонт.

Syringopora tarejaensis Tchernychev

Оригинал - ИГиГ, № 682/I7, табл.УI, фиг.Ia, б (экз.276).

Н.В.Миронова, 196I, с.I56.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, близ карьера 2-й сопки.

Нижний девон, томь-чумышские слои.

Syringopora vulgaris Yanet

Оригинал - ИГиГ, № 337/27, табл.II, фиг.9; таол.УI, фиг.8.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.27.

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, левобережье р.Черневой Бачат, Гурьевский карьер, северо-восточная стена.

Нижний девон, крековские слои.

Syringoporella moravica (Roemer)

Оригинал - ИГиГ, № 72/I22, табл. XLI, фиг.4а-в.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с.III-II3.

Кузнецкий бассейн, канавы, расположенная у восточного края Баскусанского карьера.

Средний девон, эйфельский ярус, сафоновские слои.

Syringoporella moravicoformis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/29, табл.IV, фиг.Ia-в.

В.Н.Дубатов, 1972, с.47.

Хребет Уш-Уракчан, левобережье р.Талалах, водораздел ручьев Идеал и Резерв.

Средний девон, эйфельский(?) ярус.

Tachopora altaica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689а/II, табл.I4, фиг.2а-в (экз. Д-139).
П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.68.

Горный Алтай, окрестности с.Черный Ануй, водораздел рек Ануй и Каракол.

Верхний силур, чагырская свита.

Tachopora salairica Mironova

Голотип - ИГиГ, № 689а/I4, табл.8 -I4, фиг.3а-в (экз.079-II).
П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с.69.

Салаир, правый берег р.Уксунай, в 1,5 км выше пос.Жениховского.

Верхний силур, баскусканская свита.

Thamnopora alta (Tchernyshev)

Оригиналы - ИГиГ, № 359/3, табл.I, фиг.3а,б.
359/4, табл.II, фиг.4.

Д.П.Азров, В.Н.Дубатов, 1969, с.18.

Южный Алтай, хребет Сарымсакты, правый берег р.Сарымсакты, верховье рч.Саралки.

Средний девон, эйфельский ярус.

Thamnopora alta (Tchernyshev)

Оригинал - ИГиГ, № 337/6I, табл.XXV, фиг.6.
В.Н.Дубатов, 1969, с.50.

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, левобережье р.Салаирки.

Средний девон, эйфельский ярус, шавдинские слои.

***Thamnophora bilamelloza* Битвакова**

Оригиналы - ИГиГ, № 400/31, табл.ХУ, фиг.2а,б.

400/31А, табл.ХУ, фиг.4.

400/32, табл.ХУ, фиг.3а.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с.75-77.

Хребет Ум-Уракчан, левый берег р.Талаах, около устья руч. Ледяного.

Средний девон, живецкий ярус, леденские слои.

***Thamnophora beliakovi* Dubatolov**

Оригиналы - ИГиГ, № 544/25, табл.УІІІ, фиг.4а,б.

544/26, табл.УІІІ, фиг.5.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с.105.

Рудный Алтай, правый берег р.Ульби в 30 м ниже слияния рек Тхой и Громотухе.

Средний девон, досженская свита.

***Thamnophora publichenkoi* Dubatolov**

Оригиналы - ИГиГ, № 400/33, табл.УІ, фиг.1а,б.

400/34, табл.УІ, фиг.2.

В 0,4 км ниже среднего устья руч. Ледяного.

Надвинские слои.

400/35, табл.УІ, фиг.3а,б.

В 50 м ниже среднего устья руч.Ледяного.

Леденский горизонт.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с.77-78.

Хребет Ум-Уракчан.

Средний девон, живецкий ярус.

***Thamnophora cervicornis* (Blainville)**

Оригинал - ИГиГ, № 544/27, табл.ІХ, фиг.1а-в, 2.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с.107.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, Андреевский карьер, левый борт, высотная отметка 880-900 м.

Средний девон, сокольская свита.

Thamnopora(?) dentata Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/93, табл. XXXIX, фиг. 4а, б (экз. Т-65-8).
Н.В.Миронова, 1974, с.69.

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, вершина левого склона
дога Хомичева в его верхней части.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Thamnopora diserta Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/94, табл. X, фиг. Ia-в (экз. Г 33-104).
Н.В.Миронова, 1974, с.70.

Горный Алтай, окрестности с.Камышенки, правобережье р.Камы-
шенки, в 0,2 км к юг-западу от горы Колпак.

Нижний девон, ремневский горизонт.

Thamnopora dunbeiensis Tchi

Оригинал - ИГиГ, № 72/66, табл. XXVI, фиг. Ia-г.

В.Н.Дубатов, 1963, с.69-70.

Кузнецкий бассейн, левобережье р.Салаирки, 10-я разведочная
линия, шурф 313.

Средний девон, эйфельский ярус, верхняя часть пандинских сло-
ев.

Thamnopora elegantula Tchudinova

Оригинал - ИГиГ, № 337/148, табл. LXI, фиг. 2а-в.

В.Н.Дубатов, 1969, с.108-109.

Среднее течение р.Колымы, правый берег, в 1,44 км ниже устья
рч. Памангук, в 0,2 км ниже края Известнякового карьера.

Нижний девон, верхняя часть (?).

Thamnopora(?) halimensis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/151, табл. LXII, фиг. 2а-г.

Оригинал - ИГиГ, № 337/152, табл. LXII, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатов, 1969, с.110-111,

Хребет Тас-Хаяхта, верховье р.Халим.

Нижний девон, нелюдимский горизонт, датнинская свита.

Thamnopora incerta Regnell

Оригиналы - ИГиГ, № 337/149, табл. LXI, фиг. 3а, б.

337/150, табл. LXI, фиг. 4; табл. LXII, фиг. Ia-в.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 109-110.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р. Догдо, правый берег р. Хобочало, Коралловые ворота.

Нижний девон, нелюдицкий горизонт, датнинская свита.

Thamnopora kamushensis Mironova

Оригинал - ИГиГ, № 681/96 - не изображен.

Н.В.Миронова, 1974, с. 71.

Горный Алтай, окрестности с. Соловьихи, левобережье кл. Гавица.

Нижний девон, ремневский горизонт.

amnopora khalfini Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 689а/9 (экз. I3-I8) - не изображен.

П.С.Дзюбо, Н.В.Миронова, 1960, с. 66.

Салаир, бассейн р. Уксунай, близ устья р. Большая Речка.

Верхний силур, сухая свита.

Thamnopora khalfini Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 72/61, табл. XXV, фиг. I.

72/62, табл. XXV, фиг. 2а, б.

В.Н.Дубатовлов, 1963, с. 66-67.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Томь-Чумыш, канава выше р. Тихобаевки.

Верхний силур, тиверский ярус, томь-чумышские слои.

Thamnopora kuznetskiensis (Tchernyshev)

Оригинал - ИГиГ, № 290/5, табл. III, фиг. 3а-в.

В.Н.Дубатовлов, Р.Е.Алексеева, 1967, с. 24-25.

Пенжинский хребет, руч. Веер, левый приток р. Большой Удупкин.

Средний девон, эйфельский ярус.

Thamnophora lesozpeti Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 72/68, табл. XXVI, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатов, 1963, с. 70-72.

Кузнецкий бассейн, левобережье р. Салаирки.

Средний девон, эйфельский ярус, шардинские слои.

Thamnophora nicholsoni (Fresch)

Оригинал - ИГиГ, № 400/27, табл. XIV, фиг. 1а, б.

В.Н.Дубатов, 1972, с. 74-75.

Хребет Ум-Уракчан, правый берег р. Талалах, в 70 м ниже устья руч. Ледяного.

Средний девон, живетский ярус, леденинские слои.

Thamnophora polyferata (Schlottheim)

Оригинал - ИГиГ, № 400/36, табл. XVI, фиг. 4а, б.

В.Н.Дубатов, 1972, с. 78-79.

Хребет Ум-Уракчан, 0,45 км ниже среднего устья руч. Ледяного.

Средний девон, живетский ярус, нелкинские слои.

Thamnophora polytremata Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/86, табл. LXI, фиг. 1а, б (экз. 46-5I).

68I/87, табл. LXI, фиг. 2а, б (экз. 11а-53).

68I/88, табл. LXI, фиг. 3а, б (экз. 4а-14).

68I/89, табл. LXI, фиг. 4а, б (экз. 11а-46).

Н.В.Миронова, 1974, с. 68.

Салаир, окрестности г. Гурьевска, Гурьевский холм.

Нижний девон, салаиркинский горизонт.

Thamnophora porosa nordica Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/39, табл. XVII, фиг. 2а, б.

Оригиналы - ИГиГ, № 400/38, табл. XVII, фиг. 1б, в.

Левый берег р. Талалах, в 100 м ниже устья руч. Ледяного.

Леденинские слои.

400/40, табл.ХVII, фиг.3а,б.
В 120 м ниже устья руч. Ледяного.
Верхняя часть леденинских слоев.
В.Н.Дубатовлов, 1972, с.80.
Хребет Уш-Уракчан.
Средний девон, живетский ярус.

Thamnopora rogoza rogoza Tchudinova

Оригинал - ИГиГ, № 400/37, табл.ХVI, фиг.6.
В.Н.Дубатовлов, 1972, с.80.
Юго-западная окраина Кузбасса.
Средний девон, эйфельский ярус, швабский горизонт.

Thamnopora roba acrospina Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/57, табл.ХXIII, фиг.5; табл.III, фиг.7г.
В.Н.Дубатовлов, 1969, с.46-48; 1972, с.73.
Хребет Уш-Уракчан, правый берег р.Талалах, в 70 м ниже устья руч. Ледяного.
Средний девон, живетский ярус, леденинские слои.

Thamnopora pulchra (Tchernyshev)

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/83, табл. XL, фиг.1а-е, (экз.К 48а-10).
68I/84, табл. XL, фиг.2 (экз. К 48-16).
Окрестности с.Соловьи, лог Хомичев.
68I/85, табл. XLII, фиг.1а;б (экз. А 509-9I).
Окрестности с.Сибириячки, правый берег р.Ануй.
Н.В.Миронова, 1974, с.67.
Горный Алтай.
Нижний девон, киреевский горизонт.

Thamnopora savitschevae Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/12, табл.УII, фиг.2а-д.
В.Н.Дубатовлов, Н.Я.Спасский, 1964, с.125.
Джунгарский Алатау, исток р.Большой Баскан, на водоразделе

рек Кунакбай и Жаман-Сай.

Нижний девон.

Thamnopora siavis Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 68I/90, табл.LXIII, фиг.1а,б (экз.28-7I).

68I/9I, табл.LXIII, фиг.2а,б (экз. 28-64).

68I/92, табл.LXIII, фиг.3а,б (экз. 23-II).

Н.В.Миронова, 1974, с.69.

Салаир, окрестности г.Гурьевска, Гурьевский холм.

Нижний девон, салаиркинский горизонт.

Thamnopora solida Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 72/65, табл.XXV, фиг.5а,б.

В.Н.Дубатов, 1963, с.67-68.

Кузнецкий бассейн, правобережье р.Черневой Бачат, северо-восточная стена Толсточихинского карьера.

Нижний девон, крековские слои.

Thamnopora stcherbai Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 544/28, табл.IX, фиг.3а,б.

544/29, табл.X, фиг.1а-д.

544/30, табл.X, фиг.2а,б.

В.Н.Дубатов, 1980, с.108.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, Андреевский карьер, юж - ный борт, высотная отметка 880-900 м.

Средний девон, сокольная свита.

Thamnopora subcerta Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/4I, табл.XVIII, фиг.1б-г.

Оригиналы - ИГиГ, № 400/42, табл.XIX, фиг.1б.

400/43, табл.XIX, фиг.2.

В.Н.Дубатов, 1972, с.81-82.

Хребет Тас-Хаяхта, правобережье р.Хобочало, левый берег руч. Щеточного, в 1,7 км выше устья.

Средний девон, живетский ярус, себечанский горизонт.

Thamnopora trachyporoides Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/38, табл. XIII, фиг.3.

В.Н.Дубатов, 1969, с.35.

Хребет Уш-Уракчан, левый берег р.Талалах, в 20 м ниже устья руч. Ледяного.

Средний девон, живетский ярус, леденинские слои.

Thamnopora trachyporoides Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/38, табл. XX, фиг. I.

Оригинал - ИГиГ, № 400/44, табл. XX, фиг. 2а-в.

В.Н.Дубатов, 1972, с.83-85.

Хребет Уш-Уракчан, в 20 м ниже среднего устья руч. Ледяного.

Средний девон, живетский ярус, леденинские слои.

Thamnopora urensis Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 337/58, табл. XXIII, фиг. 6.

В.Н.Дубатов, 1969, с.46-48.

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, район г.Гурьевска, левобережье р.Салаирки.

Средний девон, эйфельский ярус, шандинские слои.

Thamnopora vandae Mironova

Голотип - ИГиГ, № 68I/95, табл. XLI, фиг. 7а, б (экз. Т 74-33).

Н.В.Миронова, 1974, с.7I

Горный Алтай, окрестности с.Соловьихи, правый склон лога Хо - мичева, в его верхней части.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Thamnopora yanetae Dubatolov, Lin et Tchi

Оригинал - ИГиГ, № 290/7, табл. III, фиг. 4а-в.

В.Н.Дубатов, Р.Е.Алексеева, 1967, с.25.

Пенжинский хребет, в I км вверх по Безымянному ручью, впадающему справа в р.Гаянчалан в 5 км ниже истока.

Средний девон, эйфельский ярус.

Thamnophora yanketae Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 544/24, табл. VIII, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.104.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, Крюковская сопка, отвалы бывшего Крюковского рудника.

Нижний девон, крюковская свита.

Thamnophora sp.

Оригинал - ИГиГ, № 337/9, табл. II, фиг. 4.

В.Н.Дубатов, 1969, с.16, 19.

Хребет Тас-Хаяхта, руч. Кальонный.

Средний девон.

Thamnophora sp.

Оригинал - ИГиГ, № 681/97, табл. XII, фиг. 3а-в (экз. А-509-89).

Н.В.Миронова, 1974, с.159.

Горный Алтай, окрестности с.Сибирячихи, правобережье р.Ануй.

Нижний девон, киреевский горизонт.

Thamnophora sp.

Оригинал - ИГиГ, № 544/21, табл. VII, фиг. 6.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.158.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, Крюковская сопка, отвалы бывшего Крюковского рудника.

Нижний девон, крюковская свита.

Thescia sp.

Оригинал - ИГиГ, № 337/55, табл. XII, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатов, 1969, с.50.

Чехословакия, Баррадиен.

Верхний силур, нижние конепрусские известняки.

***Thecostegites* sp.**

Оригинал - ИГиГ, № 337/53, табл. XXI, фиг. 4.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 44.

Кузнецкий бассейн, северная окраина, район с. Лебедянского, Лебедянский карьер.

Средний девон, живетский ярус, нижняя часть лебедянских слоев.

***Tollina* sp.**

Оригинал - ИГиГ, № 302/15, табл. IV, фиг. 8, 9 (обр. 84/9).

Ю.И.Тесаков, 1965, с. 19.

Сибирская платформа, р. Нижняя Чунку, против устья р. Черлечина.

Верхний ордовик, долборский ярус.

***Trachypora* ex gr. *circulipora* Keuserling**

Оригинал - ИГиГ, № 337/25, табл. VI, фиг. 6а.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 23.

Хребет Уш-Уракчан, бассейн р. Талалах.

Средний девон.

***Trachypora divergens* Dubatolov**

Голотип - ИГиГ, № 337/25, табл. XXI, фиг. 1а, б.

В.Н.Дубатовлов, 1972, с. 88.

Хребет Уш-Уракчан, правобережье р. Талалах, водораздел ручьев Яр и Ледяного.

Средний девон, злиховский ярус.

***Trachypora* sp.**

Оригинал - ИГиГ, № 337/26, табл. VI, фиг. 7а, б; табл. XVI, фиг. 3а, б.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с. 23.

Кузнецкий бассейн, юго-западная окраина, район г.Гурьевска, левобережье рч.Салаирки.

Средний девон, эйфельский ярус, мандинские слои.

Troedssonites flexibilis Sokolov

Голотип - ИГиГ, № 261/II, табл. XXVIII, фиг. 7, 8 (обр. II4a).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.143.

Бассейн р. Колымы, р.Тирехтях.

Верхний ордовик.

Tyrganopora symbiotica Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 400/4, табл. II, фиг. 3, 4.

В.Н.Дубатов, 1972, с.41-42.

Северо-Восток СССР, хребет Тас-Хаяхта, левобережье р.Догдо, верховье р.Халти.

Средний девон, эйфельский ярус, хобочалинская свита.

Tyrganolites altaicus Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 544/44, табл. XV, фиг. 2a-b.

544/45, табл. XV, фиг. 3.

В.Н.Дубатов и др., 1980, с.115.

Рудный Алтай, район г.Лениногорска, Андреевский карьер, левый борт, высотная отметка 880-900 м.

Средний девон, сокольская свита.

Tyrganolites beresovkaensis Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, - 337/49, табл. XIX, фиг. 3; табл. XX, фиг. 2.

В.Н.Дубатов, 1969, с.41.

Рудный Алтай, р.Березовка.

Средний девон, эйфельский ярус, лосищенские слои.

Tyrganolites beresovkaensis Dubatolov

Оригинал - ИГиГ, № 544/43, табл. XV, фиг. I.

В.Н.Дубатовлов и др., 1980, с.116.

Рудный Алтай, правый берег р.Ульбн, в 1190 м ниже слияния рек Тихой и Громотухи.

Средний девон, лосищенская свита.

Vacuopora crenata Sokolov et Tesakov

Голотип - ИГиГ, № 260/50, табл.XVII, фиг.1,2 (обр.123-1).

Б.С.Соколов, Ю.И.Тесаков, 1963, с.85.

Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменная Тунгуска, р. Чуня, в 1,7 км выше устья р.Амуткан.

Верхний ордовик, низы долборского яруса.

Vacuopora comta Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 337/140, табл.LVII, фиг.1в.

Оригиналы - ИГиГ, № 337/137, табл.LV, фиг.4а,б; табл.LVII, фиг.3а-в.

337/141, табл.LVII, фиг.2а,б.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.101-103.

Хребет Сетте-Дабан, руч.Тихий.

Нижний девон, нижнесеттедабанский горизонт.

Vacuopora dogdensis Dubatolov

Голотип - ИГиГ, № 248/11, табл.VI, фиг.2-д; табл.VII, фиг.1.

В.Н.Дубатовлов, Н.Я.Спасский, 1964, с.124.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобочало, среднее течение, Коралловые ворота.

Нижний девон, верхняя часть датнинской свиты.

Vacuopora dogdensis Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 337/138, табл.LVI, фиг.2а,б.

337/139, табл.LVI, фиг.3а,б.

В.Н.Дубатовлов, 1969, с.101.

Хребет Тас-Хаяхта, бассейн р.Догдо, правый берег р.Хобочало, Коралловые ворота.

~~Нижний~~ девон, даттинская свита, нелюдемский горизонт.

Yacuticorona immae Dubatolov

Оригиналы - ИГиГ, № 681/106, табл. XI, фиг. 1а-в (экз. А 246а-22).

681/106, табл. XI, фиг. 2а, б (экз. А 246а-15).

Окрестности с. Соловьихи, левобережье лога Хомичева, в его верхней части.

681/107, табл. XII, фиг. 4а, б; 5а, б (экз. Г 33-205).

Окрестности с. Камышевского, левобережье р. Камышенки.
Н. В. Миронова, 1974, с. 79.

Горный Алтай.

~~Нижний~~ девон, ремневский горизонт.

ЛИТЕРАТУРА

- Авров Д.П., Дубатолов В.Н. Стратиграфия и табуляты нижнего и среднего девона хребтов Сарымсақты и Листвяга (Южный Алтай). - В кн.: Верхний палеозой Сибири и Дальнего Востока. М.: Наука, 1969, с.5-28, табл. I-Y, рис. I-8.
- Дзюбо П.С., Миронова Н.В. Подкласс *Tabulata*. - В кн.: Биостратиграфия палеозоя Саяно-Алтайской горной области. Новосибирск, 1960, с. 56-74, табл. s-8 - s-16, рис. 2. (Труды СНИИГГиМС, вып. 20, том II).
- Дубатолов В.Н. О регенирации у палеозойских кораллов. - Палеонтологический журнал, 1961, № I, с. 75-81, табл. X-XI.
- Дубатолов В.Н. Позднесилурийские и девонские табуляты, гелиолиитиды и хететиды Кузнецкого бассейна. - М.: Изд-во АН СССР, 1963, -194 с., табл. I- XLV, рис. I-7.
- Дубатолов В.Н. Табуляты и биостратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР. - М.: Наука, 1969 -178 с., табл. I- LXVII, 46 рис. (Труды ИГиГ, вып. 70).
- Дубатолов В.Н. Табуляты и биостратиграфия среднего и верхнего девона Сибири. - М.: Наука, 1972. -183 с., табл. I-XXX, 9 рис. (Труды ИГиГ, вып. 134).
- Дубатолов В.Н., Алексеева Р.Е. Некоторые среднедевонские табуляты и брахиоподы Пенжинского хребта (Корякское нагорье). - В кн.: Новые данные по биостратиграфии девона и верхнего палеозоя Сибири. М.: Наука, 1967, с.21-27, III-Y.
- Дубатолов В.Н., Дубатолова Д.А., Козлов М.С., Спасский Н.Я. Биостратиграфия нижнего и среднего девона Рудного Алтая. - М.:

- Наука, 1980, с.4-95, табл. I-XV. (Труды ИГиГ, вып. 425).
- Дубатов В.Н., Миронова Н.В. Подкласс *Tabulata*. - В кн.: Биостратиграфия палеозоя Саяно-Алтайской горной области. Новосибирск, 1960, с.349-368, табл. Д-17 - Д-26, рис. 43, 44. (Труды СНИИГТИМС, вып. 20, том II).
- Дубатов В.Н., Спасский Н.Я. Стратиграфический и географический обзор девонских кораллов СССР. - М.: Наука, 1964, с.3-132, табл. I-IX.
- Краснов В.И., Миронова Н.В., Асташкина А.Ф. О возрасте сухой свиты. - В кн.: Актуальные вопросы региональной геологии Сибири. Новосибирск, 1978, с. 78-100, табл. I-II. (Труды СНИИГТИМС, вып. 258).
- Миронова Н.В. Два новых рода табулят. - В кн.: Материалы по палеонтологии и стратиграфии Западной Сибири. - Л.: Гостоптехиздат, 1960, с.95-98, табл. XI (Труды СНИИГТИМС, вып. 8).
- Миронова Н.В. Новый род табулят из семейства ценитид. - В кн.: Материалы по палеонтологии и стратиграфии Западной Сибири. - Л.: Гостоптехиздат, 1961, с.177-179, табл. I. (Труды СНИИГТИМС, вып. 15).
- Миронова Н.В. Табуляты и гелиолитиды томь-чумышских (остракодовых) слоев Салаира. - В кн.: Материалы по палеонтологии и стратиграфии Западной Сибири. - Л.: Гостоптехиздат, 1961, с. 148-163, табл. I-VI. (Труды СНИИГТИМС, вып. 15).
- Миронова Н.В. Некоторые новые виды табулят и гелиолитид из верхнегеласкура Салаира и Горного Алтая. - В кн.: Табулятоморфные кораллы ордовика и силура СССР. М.: Наука, 1965, с.127-137, табл. XXVIII-XXXIV. (Труды I Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов, вып. I).
- Миронова Н.В. О роде *Gephuropora* Etheridge и строении стенок у фавозитид. - В кн.: Табуляты и гелиолитоидеи палеозоя СССР. М.: Наука, 1971, с.34-44, табл. XIII-XIV, 10 рис. (Труды II Всесоюз. симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР, вып. I).
- Миронова Н.В. Раннедевонские табуляты Горного Алтая и Салаира. - Новосибирск: Зап.-Сиб. книжное изд-во, 1974. - 164 с., табл. I-LXXXI, 18 рис. (Труды СНИИГТИМС, вып. 163).
- Миронова Н.В. Некоторые пражидольские табуляты Центрального Алтая. В кн.: Фауна и биостратиграфия верхнего ордовика и силура

Алтае-Саянской области. М.: Наука, 1978, с.104-117, табл. XVI-XIX. (Труды ИГиГ, вып. 405).

Соколов Б.С., Тесаков Ю.И. Табуляты палеозоя Сибири. - М.-Л.: Из-во АН СССР, 1963, - 188с., табл. I-XXIX, II рис.

Тесаков Ю.И. Цепочечные фавозитиды. - В кн.: Табулятоморфные кораллы ордовика и силура СССР. - М.: Наука, 1965, с. 14-19, табл. I-IV, (Труды I Всесоюз. симпозиума по изучению ископаемых кораллов, вып. I).

УКАЗАТЕЛЬ РОДОВ

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Adetopora - 5 | Crenulipora - 25 |
| Alveolitella - 5,6 | Cryptolichenaria - 25 |
| Alveolites - 7-9 | Cyclochaetetes - 25 |
| Amsassia - 10 | Cystihalysites - 25,26 |
| Armalites - 10 | |
| Aulocystella - 10 | Dendropora - 26 |
| Aulopora - 11 | Dictyofavosites - 26-28 |
| Axulites - 11 | |
| | Echyropora - 29 |
| Baikitolites - 11 | Egosiella - 30-32 |
| Barrandeolites - 11 | Emmonsia - 32 |
| | |
| Calapoecia - 12 | Favosites - 33-46 |
| Caliapora - 12-14 | |
| Catenipora - 14 | Gephuropora - 47-49 |
| Chaetetes - 14,15 | Grabaulites - 49 |
| Chaetetipora - 15 | Gracilopora - 49-51 |
| Ceratopora - 15 | |
| Cladopora - 15-18 | Halysites - 51, 52 |
| Cleistopora - 18 | Heliolites - 52, 53 |
| Coenites - 18 - 21 | Hillaepora - 54 |
| Columnoporella - 21,22 | |
| Crassialveolites - 22-24 | Klaamannipora - 54 |

Laceripora - 54
 Lecomptia - 55
 Lyopora - 55

 Mariusilites - 56
 Mesofavosites - 56-58
 Mesosolenia - 58,59
 Multisolenia - 59,60

 Natalophyllum - 60
 Nekhoroshevilites - 60
 Neuroemeria - 6I
 Nyctopora - 6I

 Pachycanalicula - 6I
 Pachyfavosites - 62-67
 Pachypora - 67,68
 Palaeofavosites - 68,69
 Paralleloporella - 70
 Parasarcinula - 70,7I
 Parastriatopora - 7I-75
 Paratetradium - 75
 Placocoenites - 75-78
 Pleurodictyum - 78
 Plicatomurus - 78, 79
 Propora - 79

 Rhabdotetradium - 79
 Rhiphaeolites - 80
 Roemeripora - 80, 8I
 Roemerolites - 8I
 Rossopora - 8I

 Scoliopora - 8I,82
 Sibiriolites - 82, 83
 Schedohalisites - 83
 Squameoalveolites - 83

 Squameofavosites - 83-90
 Squameofavosites (Dictyofavosites) - 9I
 Spiroclados - 9I
 Stelliporella - 9I,92
 Striatopora - 92-98
 Striatoporella - 98,99
 Subalveolitella - 99
 Subalveolites - 99, IOO
 Subfavosites - IOO, IOI
 Syringolites - IOI
 Syringopora - IO2, IO3
 Syringoporella - IO3, IO4

 Taxopora - IO4
 Thamnopora - IO4-II2
 Thecia - II2
 Thecostegites - II3
 Tollina - II3
 Trachypora - II3
 Troedssonites - II4
 Trypanopora - II4
 Tyrganolites - II4

 Vacuopora - II5

 Yacutiopora - II5, II6

УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ

abnormis, Gracilopora(?) - 49
abnormis, Pachyfavosites - 62
abramovi, Crassialveolites - 22
absolutus, Nekhoroshevilites - 60
acerosa, Columnoporella - 21
acrospinosus, Favosites - 33
acuta, Gracilopora - 50
acutus, Favosites - 33
aculeatissimus, Crenulipora - 25
admirabilis, Favosites - 33
admirabilis, Subfavosites - 100
alta, ~~Tham~~nopora - 104
altaica, Gracilopora - 50
altaica Hillaepora - 54
altaica, Klaamannipora - 54
altaica, Lecomptia - 55
altaica, Pachypora - 67
altaica, Roemeripora - 80
altaica, Taxopora - 104
altaicus, Alveolites - 7
altaicus Armalites - 10
altaicus, Favosites - 34
altaicus, Mariusilites - 56

altaicus, Tyrganolites - II4
alveolitoides, Baikitolites - II
ambiguus, Heliolites - 52
ambiguus, Squameofavosites - 83
anastomosus, Coenites - 18
angoporoides, Palaeofavosites - 68
annexus, Adetopora - 5
anticostiensis, Calapoecia - 12
anuiensis, Axuolites - II
anuiensis, Pachypora - 67
anuyensis, Mesofavosites - 56
anuyensis, Striatopora - 92
argutus, Palaeofavosites - 68
arapeosa, Stelliporella - 91
astashkinae, Plicatomurus - 78
astrovae, Palaeofavosites - 68
avidus, Pachyfavosites - 62
avrovi, Spiroclados - 91

balticus, Palaeofavosites - 69
basalticus, Favosites - 34
batschatensis, Roemerolites - 81
beliakovi, Thamnopora - 105
bella, Cladopora - 15
beresovkaensis, Tyrganolites - II4
bilamellosa, Thamnopora - 105
bogdanovi, Favosites - 34
bohémica, Roemeripora - 80
bogemicus, Squameofavosites - 84
bogemicus, Squameofavosites, taimyrica - 84
bonus, Paralleloporella (?) - 70
borealis, Favosites - 34
brevisseptatus, Favosites - 34
brusnitzini, Favosites - 35
bublichenkoi, Thamnopora - 105
bulvankerae, Coenites - 18
bystrowi, Pachyfavosites - 62
brusnitzini, Squameofavosites - 84

canadensis, *Calapoecia* - 12
capillaris, *Placocoenites* - 75
carinatus, *Plaeofavosites* - 69
catenatus, *Favosites* - 35
cervicornis, *Thamnopora* - 105
chaetetoides, *Stelliporella* - 92
chekhoviche, *Propora* - 79
circulipora, *Trachypora* ex gr. - 113
clarus, *Favosites* - 35
clerbispinus, *Favosites* - 35
compacta, *Columnoporella* - 22
comta, *Yacutiopora* - 115
concentricus, *Squameofavosites* (*Dictyofavosites*) - 91
conferta, *Scoliopora*, *omolonica* - 81
conspicuus, *Favosites* - 35
crassa, *Lyopora* - 55
crassicaulis, *Alveolitella* - 5
crassimurelis, *Chaetetes* - 14
crassimus, *Crassialveolites* - 22
crassimus, *Placocoenites* - 75
crassiramosa, *Egosiella* - 30
crassispinosum, *Pleurodictyum* - 78
crassus, *Crassialveolites* - 22
crebespinus, *Favosites* - 36
crebra, *Striatopora* - 92
crebrispinosa, *Gephuropora* - 47
crenata, *Vacuopora* - 115
cribratus, *Squameofavosites*, *gracilisquamatus* - 85
crispa, *Syringopora* - 102
curicus, *Favosites* - 36
cylindrica, *Pachypora* - 67
cylindrocellularis, *Gladopora* - 16
cylindrocellularis, *Egosiella* - 30

densus, *Halysites* - 51
dentata, *Pachycanalicula* - 61
dentata, *Thamnopora* (?) - 106

denticulata, *Nyctopora* - 61
denticulata, *Scoliopora* - 82
dictyofavositoides, *Squameofavosites* - 85
difformis, *Favosites* - 36
difformis, *Paralleloporella* - 70
diffusus, *Favosites* - 37
dilutus, *Favosites* - 37
diserta, *Thamnopora* - 106
distinctus, *Alveolites* - 7
divergens, *Trachypora* - 113
diversus, *Crassialveolites*(?) - 22
diversus, *Dictyofavosites* - 26
divissimus, *Squameofavosites* - 85
dobretzovi, *Parastriatopora* - 71
dogdensis, *Alveolites* - 7
dogdensis, *Parastriatopora* - 71
dogdensis, *Striatoporella* - 98
dogdensis, *Yacutiopora* - 115
dragunovi, *Cystihalites* - 25
dubatolovi, *Squameofavosites* - 85
dubovicovi, *Grabaulites* - 49
dunbeiensis, *Thamnopora* - 106
dziuboe, *Mesofavosites* - 56

effecta, *Cladopora* - 16
effusus, *Favosites* - 37
elegans, *Coenites* - 19
elegans, *Echyropora* - 29
elegans, *Sibiriolites* - 82
elegantula, *Thamnopora* - 106
endygashensis, *Caliapora* - 12
escharoides, *Placocoenites* ex gr. - 75
etheridgei, *Gephuropora* - 47
evidens, *Crassialveolites* - 23
eximius, *Alveolites* - 7

falsus, *Coenites* - 19
fascicularis, *Syringopora* - 102

favositiformis, *Paralleloporella* - 70
fedotovi, *Favosites* - 37
festiva, *Mesosolenia* - 58
festivus, *Mesosolenia* - 59
figurata, *Alveolitella* - 5
finitimus, *Squameofavosites* - 85
flexibilis, *Lyopora* - 55
flexibilis, *Troedssonites* - II4
fleximurinus, *Mesofavosites ex gr.* - 57
floriforme, *Rhabdotetradium* - 79
formosa, *Multisolenia* - 59
frequens, *Squameofavosites* - 86
fungites, *Squameofavosites* - 86
fungitiformis, *Squameofavosites* - 86

ganinensis, *Alveolites(?)* - 8
ganinensis, *Coenites(?)* - I9
ganinensis, *Egosiella* - 30
ganinensis, *Gracilopora* - 50
ganinensis, *Mesofavosites* - 57
gigantea, *Alveolitella* - 6
gincyngeri, *Pachyfavosites* - 62
globosa, *Emmonsia* - 32
globosiformis, *Emmonsia* - 32
goldfussi, *Favosites cf.* - 37
goldfussi, *Favosites*, *multiforatilis* - 37
gothlandicus, *Favosites*, *taimyrica* - 38
gracianovae, *Riphaeolites(?)* - 80
graciosus, *Favosites* - 38
gradatus, *Placocoenites* - 76
grandis, *Egosiella* - 30
grandis, *Parastriatopora* - 71
grandissima, *Parastriatopora* - 72
gratica, *Striatoporella* - 98
graviorus, *Dictyofavosites* - 26
gregalis, *Subfavosites(?)* - I00
gubachevi, *Catenipora* - I4
gurjevskiensis, *Squameofavosites* - 86, 87.

hamadai, *Halysites* - 51
halimensis, *Thamnopora*(?) - 106
helenae, *Egosiella* - 32
hidensisiformis, *Favosites*? - 38
hidensisiformis, *Pachyfavosites* - 63
humilis, *Favosites* - 38
humilissimus, *Alveolitella* - 6

idonea, *Caliapora* - 12
illustra, *Striatopora* - 93
incerta, *Thamnopora* - 107
incrassatus, *Crassialveolites* - 23
incrustans, *Squameofavosites*(?) - 83
indistinctus, *Syringolites*(?) - 102
innae, *Parastriatopora* - 72
innae, *Yacutiopora* - 116
insignis, *Alveolites* ex gr. - 8
insolitus, *Squameofavosites* - 87
intricatus, *Squameofavosites* - 87
ivanovi, *Palaeofavosites* - 69

jejuna, *Striatopora* - 93
jejunus, *Heliolites* - 52

kamysheensis, *Thamnopora* - 107
kanuensis, *Palaeofavosites* - 69
kaplunae, *Stelliporella* - 92
karcevae, *Squameofavosites* - 87
karpinskyi, *Subfavosites* - 100
kemali, *Favosites* cf. - 39
kernerii, *Caliapora*(?) - 12
khalfini, *Mesofavosites* - 57
khalfini, *Striatopora* - 93
khalfini, *Thamnopora* - 107
khomichevensis, *Armalites* - 10
kimi, *Striatopora* - 93
klaamanni, *Subfavosites* - 101

kolymensis, Favosites - 39
kokscharskajae, Cladopora - 16
kozlovi, Favosites - 39
kozlowskii, Pachyfavosites - 63
kozlowskii, Pachyfavosites ex gr. - 64
krasnovi, Pachypora(?) - 67
krekovensis, Crassialveolites - 23,24
kulkovi, Squameofavosites - 87
kunjakensis, Favosites - 39
kuznetskiensis, Thamnopora - 107

labyrinth, Mesosolenia - 59
labyrinthica, Multisolenia - 59
lamellatus, Crassialveolites - 24
lamellicornis, Pachypora - 68
laxus, Schedohalisites - 83
lecomptei, Egosiella - 31
lecomptei, Thamnopora - 108
leleshusi, Mesofavosites - 57
liber, Cystihalisisites - 26
lidia, Alveolites - 8
longa, Striatopora - 94
longirameus, Coenites - 19
longispina, Parastriatopora - 72

macropora, Dendropora, marcida - 26
macroporosa, Caliapora - 13
macrorematus, Crassialveolites - 24
magnificus, Cyclochaetetes - 25
magnus, Baikitolites - 11
magnus, Chaetetes - 15
mamillatus, Favosites - 40
marginata, Parastriatopora - 72

markovskii, Pachyfavosites - 64
mediocris, Mesofavosites - 57
medius, Placocoenites - 76
microalveolata, Egosiella - 31

microcellulata, *Cladopora* - 16, 17
microporosus, *Dictyofavosites* - 26, 27
minima, *Gracilopora* - 50
minuscula, *Striatopora* - 94
minutissima, *Scoliopora*(?) - 82
miranda, *Cryptolichenaria* - 25
misera, *Multisolenia* - 59
moravica, *Syringoporella* - 103
moravicoformis, *Syringoporella* - 103
moyeroensis, *Favosites* - 40
moyeroensis, *Mesofavosites* - 58
multicorallites, *Coenites* - 20
multiformis, *Favosites*(?) - 40
multiperforatus, *Crassialveolites* - 24
multiplicatus, *Favosites* - 40
multiportalifera, *Striatoporella* - 98

nagorskyi, *Dictyofavosites* - 27
nana, *Gracilopora* - 50
nativa, *Striatoporella* - 99
nekhorochevi, *Barrandeolites*(?) - II
nicholsoni, *Nyctopora* - 61
nicholsoni, *Thamnopora* - 108
nigeranuyensis, *Mesofavosites* - 58
nikiforovae, *Favosites* - 41
nikiforovae, *Multisolenia* - 60
nikiforovae, *Squameofavosites* - 88
nitella, *Pachyfavosites*(?) - 64
nobile, *Rhabdotetradium* - 79

oblongus, *Favosites* - 41
obsoleta, *Parastriatopora* - 73
oculiporoides, *Pachyfavosites* - 64
omolonica, *Echyropora* - 29
omoloniensis, *Caliapora* - 13
omoloniensis, *Grabaulites* - 49
opaca, *Pachycanalicula* - 61
orbiculata, *Cladopora* - 17

orientalis, Placocoenites - 76
 ornata, Striatopora - 94

 paleoforma, Gephuropora(?) - 47
 paradoxa, Parastriatopora(?) - 73
 parallela, Egosiella - 3I
 parastriatoporoides, Favosites - 4I
 parvula, Gephuropora - 48
 parvus, Halysites - 52
 patens, Favosites - 4I
 pauca, Syringopora - IO2
 paulus, Paleofavosites - 69
 peetzi, Squameofavosites - 88
 peetzi, Striatopora - 94,95
 peetzi, Striatopora, settedabanica - 95
 pellicularis, Crassialveolites - 24
 pessima, Chaetetipora - I5
 polaris, Favosites - 4I
 polenowi, Alveolitella - 6
 polyforata, Thamnopora - IO8
 polymorphus, Pachyfavosites - 64
 polytreata, Thamnopora - IO8
 porosa, Thamnopora, nordica - IO8
 porosa, Thamnopora, porosa - IO9
 praecedens, Subfavosites - IOI
 praemaximus, Favosites - 42
 preplacenta, Pachyfavosites - 65
 prima, Masosolenia - 59
 primitiva, Calliopora - I3
 primus, Pachyfavosites - 65
 proba, Thamnopora, acrospina - IO9
 proprius, Squameofavosites - 88
 pseudoforbèsi, Favosites, muratsiensis - 42
 pseudofungites, Squameofavosites - 88
 pseudoorthopteroides, Halysites - 52
 pseudosocialis, Favosites - 42
 pulchra, Egosiella - 3I
 pulchra, Thamnopora - IO9

pulchra, *Scoliopora* - 82
pussillum, *Natalophyllum* - 60

quadrilobatum, *Paratetradium* - 75

radugini, *Aulopora* - II
ramosa, *Lecomptia* - 55
ramosa, *Roemeripora*(?) - 80
rariporosus, *Pachyfavosites* - 65, 66
regularissimus, *Subfavosites* - IOI
repentina, *Subalveolitella* - 99
reticulatus, *Sibiriolites* - 83
robustus, *Favosites* - 42
rotundatus, *Dictyofavosites* - 27
rotundus, *Dictyofavosites* - 28
rotundus, *Placocoenites* - 77
rudispininosa, *Gephuropora* - 48
rukhini, *Placocoenites* - 77
rsosnickajae, *Parastriatopora* - 73

salairica, *Aulocystella* - IO
salairica, *Laceripora* - 54
salairica, *Propora* - 79
salairica, *Roemeripora* - 80
salairica, *Striatopora* - 95
salairica, *Taxopora* - IO4
salairicus, *Dictyofavosites* - 28
salairicus, *Grabaulites* - 49
salairicus, *Placocoenites* - 77
salairicus, *Squameofavosites* (*Dictyofavosites*) - 9I
savitschevae, *Thamnopora* - IO9
scaberrimus, *Placocoenites* - 77
schmidtii, *Syringopora* - IO2
schulzei, *Syringopora* - IO3
shengi, *Favosites* - 42
shengi, *Favosites*, *minor* - 43
siavis, *Thamnopora* - IIO
sibirica, *Gephuropora* - 48

sibiricus, Alveolites - 8
 sibiricus, Coenites - 20
 sibiricus, Mariusilites - 56
 sibiricus, Sibiriolites - 83
 simacovi, Coenites - 20
 simplex, Coenites - 20
 singularis, Squameofavosites - 88
 socialis, Favosites - 43
 socialis, Favosites, hasterostila forma 43, 44
 socialis, Favosites, laeta forma - 44
 socialis, Favosites, patteiformis forma - 44
 socialis, Favosites, typica forma - 44, 45
 socialisiformis, Squameofavosites - 89
 sokolovi, Squameofavosites - 89
 solida, Thamnopora - 110
 spica, Hillaepora - 54
 spinosa, Parasarculina - 70
 spinotuberculatus, Subalveolites - 99
 spongiosus, Squameofavosites - 89
 stcherbai, Thamnopora - 110
 stepanovi, Plicatomurus - 78
 strigosus, Alveolites - 8, 9
 subcerta, Thamnopora - 110

 suborbicularis, Alveolites aff. - 9
 subrotunda, Striatopora - 95
 subulosus, Subalveolites - 99
 suffruticosus, Armalites - 10
 sulcatus, Favosites - 45
 suni, Cladopora - 17
 supragigantea, Syringopora - 103
 suspectus, Favosites - 45
 symbiotica, Trypanopora - 114
 syvjuensis, Favosites, yacuticus - 45

 taltiensis, Calliopora - 14
 tarejensis, Syringopora - 103

tcherepninae, Mesofavosites - 58
 tchergaensis, Heliolites - 52
 tchergaensis, Placocoenites - 78
 tchumyshensis, Parastriatopora - 73
 tebenjkovi, Parastriatopora - 74
 tenella, Coenites - 2I
 tenera, Gracilopora - 5I
 tenuimuralis, Striatopora - 96
 tenuimurus, Mesofavosites - 58
 tenuissima, Cladopora - I7
 thetidis, Squameofavosites - 89
 tischnoffi, Alveolites - 9
 tomchumyshensis, Pachypora - 68
 tomensis, Squameofavosites - 90
 tortuosa, Multisolonia - 60
 trabeculata, Parasarcinula - 7I
 trachyporoides, Thamnopora - III
 tschichatschewi, Striatopora - 96
 tschichatschewi, Striatopora, tschichatschewi - 97
 tschichatschewi, Striatopora, yacutica - 97

 uimenensis, Pachyfavosites - 66
 uksunayensis, Heliolites - 53
 undosa, Parastriatopora - 74
 unicus, Plicatomurus - 79
 uralensis, Squameofavosites(?) - 90
 uralica, Caliapora - I4
 uralica, Parastriatopora, minima - 74
 uralica, Parastriatopora, uralica - 74
 urensis, Thamnopora - III
 uxunaiensis, Subfavosites - IOI

 vaigachensis, Coenites - 2I
 vandrae, Thamnopora - III
 vectorius, Favosites - 45
 vinkmanae, Alveolitella - 6
 virgulata, Geratopora - I5

vijaicus, Pachyfavosites - 66
vijaicus, Pachyfavosites ex gr. - 66
volutus, Subalveolites - I00
vulgaris, Egosiella - 3I
vulgaris, Heliolites - 53
vulgaris, Syringopora - I03

westsibirica, Neuroemeria - 6I

yanetae, Egosiella - 32
yanetae, Thamnopora - III, II2
yavorskyi, Cladopora - I8
yavorskyi, Gracilopora - 5I
yermolaevi, Favosites - 46
yüi, Pachyfavosites - 67

zeaporoides, Striatopora - 97

sp., Alveolites - 9
sp., Amsassia - I0
sp., Cleistopora - I8
sp., Coenites - 2I
sp., Favosites - 46
sp., Gephuropora - 49
sp., Heliolites - 53
sp., Palaeofavosites - 69
sp., Parastriatopora - 74, 75
sp., Placocoenites - 78
sp., Roemeripora - 8I
sp., Rossopora - 8I
sp., Scoliopora - 82
sp., Squameofavosites - 90
sp., Squameofavosites (Dictyofavosites) - 9I
sp., Striatopora - 97, 98
sp., Thamnopora - II2
sp., Thecia - II2
sp., Thecostegites - II3
sp., Tollina - II3
sp., Trachypora - II3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Список оригиналов	5
Подкласс <i>Tabulata</i>	5
Литература	II7
Указатель родов	I20
Указатель видов	I22

КАТАЛОГ ОРИГИНАЛОВ
хранящихся в палеонтологическом отделе
Центрального Сибирского геологического музея
при Институте геологии и геофизики

Утверждено к печати
Институтом геологии и геофизики СО АН СССР

Технический редактор *Л.А. Жукова*

Подписано к печати	29.01.82.	МН 15274
Бумага 60×84/16. Печ.л.	8,5	Уч.-изд.л. 5,0
Тираж 400.	Заказ 138	Цена 35 коп.

Институт геологии и геофизики СО АН СССР
Новосибирск, 90. Ротапринт.